


普通高中课程标准实验教科书

数学 ③

必修

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
中学数学教材实验研究组



秦九韶算法框图



人民教育出版社

B 版

普通高中课程标准实验教科书 数学3 必修 B版

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
中学数学教材实验研究组

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编: 100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京天宇星印刷厂

版 次 2007年4月第2版

印 次 2019年8月第22次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16

印 张 8.25

字 数 184千字

书 号 ISBN 978-7-107-17712-5

定 价 7.55元

价格依据文件号: 京发改规[2016]13号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题, 请登录中小学教材意见反馈平台: jcyjfk.pep.com.cn

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社联系。电话: 400-810-5788

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学们:

你们手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制, 在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从2013年秋季学期起, 北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家环境标准(HJ2503-2011)《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分: 平版印刷》, 绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料, 生产过程注重节能减排, 印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来, 支持绿色印刷, 选择绿色印刷产品, 共同关爱环境, 一起健康成长!

北京市绿色印刷工程

主 编 高存明

本册主编 高尚华

编 者 陈 研 高尚华 王旭刚

陈亦飞 王殿军 黄 铎

责任编辑 王旭刚

美术编辑 张 蓓 王 喆

绘 图 王 鑫

封面设计 林荣桓

本册导引

欢迎同学们进入数学3的学习。本模块将学习三部分内容：算法、统计和概率。

“算法”在数学1就已进入你的视野，你已看到用数学语言描述过的算法。你可能会觉得算法比较机械、刻板甚至有点枯燥。这一章我们将较系统地学习算法，通过这一章的学习，你一定会体会到学习算法的重要作用，而且你也一定能感受到学习算法的乐趣。算法一章主要是要求同学们掌握算法的基本思想，能写出或用程序框图画简单数学问题的算法。希望有条件使用计算机的同学能用程序设计语言编写程序，通过上机运算来体会算法思想的重要性和有效性。

本模块的第二章和第三章内容是统计和概率。

在义务教育阶段，同学们初步接触到统计，获得了一些统计知识。在此基础上本模块介绍若干抽样方法，通过实例，学习用样本估计总体的思想，进一步体会统计思想与统计方法。收集、整理、分析数据是统计学的基本内容，通过收集大量的数据，从中提取有价值的信息，经过数据分析，对现象作出判断，以对“行为”作出合理的建议或决策。这就是统计学的任务。

概率与统计都是研究随机现象的，它们有着深刻的内在联系。概率为人们认识随机现象和解决这类实际问题提供了有效的方法，同时为统计学的发展提供了理论基础。这一章将通过对实际现象的观察与研究，了解概率的基本性质和几种概率模型，从中体会、理解概率的意义和在现实生活中的重要作用。


在统计与概率的学习中，教材力求将算法融入统计与概率的学习之中，一方面让同学们知道，如何应用统计与概率思想设计好的算法，另一方面可以进一步体会算法的精要，帮助我们解决实际统计与概率问题。

算法、统计、概率的基础知识，已经成为未来公民的必备常识，它们的共同特点是富于实践性。同学们可以通过实践领会它们的精要，反过来，可以应用它们的思想与方法去解决实际问题。虽然同学们对它们的内容比较生疏，但它们的可实践性将帮助大家渡过难关。我们相信，同学们会怀着强烈的求知欲望和浓厚的兴趣投入本模块的学习活动。


目 录

第一章 算法初步	1
1.1 算法与程序框图	3
◆ 1.1.1 算法的概念	3
◆ 1.1.2 程序框图	7
◆ 1.1.3 算法的三种基本逻辑结构和框图表示	10
1.2 基本算法语句	16
◆ 1.2.1 赋值、输入和输出语句	16
◆ 1.2.2 条件语句	20
◆ 1.2.3 循环语句	22
1.3 中国古代数学中的算法案例	27
本章小结	34
阅读与欣赏	
我国古代数学家秦九韶	36
东方数学的使命	36
附录 1 解三元一次方程组的算法、框图和程序	38
附录 2 Scilab 部分函数指令表	42
第二章 统计	47
2.1 随机抽样	49
◆ 2.1.1 简单随机抽样	50
◆ 2.1.2 系统抽样	52
◆ 2.1.3 分层抽样	53
◆ 2.1.4 数据的收集	54
2.2 用样本估计总体	58
◆ 2.2.1 用样本的频率分布估计总体的分布	58
◆ 2.2.2 用样本的数字特征估计总体的数字特征	65
2.3 变量的相关性	73
◆ 2.3.1 变量间的相关关系	73
◆ 2.3.2 两个变量的线性相关	74

实习作业	81
本章小结	83
阅读与欣赏	
蚂蚁和大象谁的力气更大	86
附录 随机数表	87
第三章 概率	89
3.1 事件与概率	91
◆ 3.1.1 随机现象	91
◆ 3.1.2 事件与基本事件空间	92
◆ 3.1.3 频率与概率	95
◆ 3.1.4 概率的加法公式	98
3.2 古典概型	102
◆ 3.2.1 古典概型	102
◆ 3.2.2 概率的一般加法公式(选学)	106
3.3 随机数的含义与应用	109
◆ 3.3.1 几何概型	109
◆ 3.3.2 随机数的含义与应用	110
3.4 概率的应用	116
本章小结	119
阅读与欣赏	
概率论的起源	121
 附录	
部分中英文词汇对照表	122
 后记	123



秦九韶算法框图



第一章 算法初步

```
SciPad - F:\SCILAB\2月16日\2.2.1
File Edit Search Windows Options Load into Scilab Help

// 二分法求方程的近似解
// 输入函数和初始值，确定：
// 方程的近似解是：string(x1)，确定：
// 方程的近似解是：string(x2)，确定：

while (abs(x2-x1)>=1e-4 && flag==0)
    m=(x1+x2)/2;
    if (f(m)==0)
        break;
    else if (f(m)*f(x1)<0)
        x2=m;
    else
        x1=m;
end

// 输出结果
printf('方程的近似解是：%.4f\n',x1);
end

// 输出结果
printf('方程的近似解是：%.4f\n',x2);
end
```

1.1

1.2

1.3

```
SciPad - B:\二分法_SCI
File Edit Search Windows Options Load into Scilab Help

title='二分法程序';
x=message('请输入函数，例如 log(x)-2/x',...
'请输入指定区间的左端点，例如 1',...
'请输入指定区间的右端点，例如 30',...
'请输入误差值，例如 0.0001');
r=sci_mdialog('title',x,['log(x)-2/x','1','30','0.0001']);
// 输出结果：输入函数：x，右端点及左端点的初始值

f=eval(r(1)); // 函数
left_point=eval(r(2)); // 左端点
right_point=eval(r(3)); // 右端点
e=eval(r(4)); // 误差
flag=0; // 输出程序是否结束


while (abs(right_point - left_point)>= e && flag==0)
    mid_point=(left_point + right_point)/2; // 计算中点
    f_mid=eval(f, mid_point); // 计算中点的函数值
    if (f_mid==0) // 中点恰好是根，直接输出并结束程序
        break;
    else if (f_mid*f(left_point)<0) // 如果左端点的函数和中点的函数异号
        right_point=mid_point; // 将中点作为新区间的左端点
    else // 否则
        left_point=mid_point; // 将中点作为新区间的右端点
    end
end

x_message('函数'*fname*'的近似零点是：',strcat(mid_point),',' ,'确定');
end
```

算法与程序框图

基本算法语句

中国古代数学中的算法案例



在数学1中，我们学习过求函数零点的二分法算法，在数学2的解析几何初步中，我们又把利用公式计算的几何问题进行分步求解。这些计算方法都有一个共同的特点，就是对一类问题（不是个别问题）都有效，计算可以一步一步地进行，每一步都能得到唯一的结果。通常我们把这一类问题的求解过程，叫做解决这一类问题的算法。算法一般是机械的，有时要进行大量重复的计算，它的优点是一种通法，只要按部就班地去做，总能算出结果。通常把算法过程称为“数学机械化”。数学机械化最大的优点，是它可以让计算机来完成。

在数学发展的历程中，寻求对一类问题的算法一直是数学发展的一个重要特点。在现代，“算法”已是数学及其应用科学中的重要组成部分，并成为计算科学的重要基础。随着现代信息技术的飞速发展，算法在科学技术和社会发展中发挥着越来越大的作用，并日益融入社会生活的许多方面。算法思想也逐渐成为每个现代人应具有的数学素养。

我们还要特别向同学们指出，我国古代数学发展的主导思想，就是构造“算法”解决实际问题。在这种思想的主导下，我国古代直到宋、元时期，数学的发展一直处于世界的领先地位。这一章的最后一节，我们要举例说明我国古代数学中蕴含的丰富的算法思想，以此引导同学们能沿着中国数学机械化的道路，学习数学，研究数学。

在用数学方法求解问题的过程中，提出问题、构造算法和使用计算工具，这三项工作始终紧密地联系在一起。从结绳计数、算筹到计算机的产生，计算工具的发展大大加快了研究算法的进程。现在我国高级中学大都拥有计算机，为学习算法提供了有力的工具。在这一章，我们将通过数学语言叙述、画程序框图和使用程序语言，学习基本算法语句的结构。

我们选用 Scilab 语言来实现算法。这种语言简单、容易学习，我们相信 Scilab 会成为同学们学习数值算法的好帮手。同学们可以使用 Scilab，将自己设计的算法在计算机上运行。你一定能获得成功的喜悦，做许多你用笔和纸不敢做的数学题，为你今后在数学的学习中使用计算机技术打下良好的基础。

1.1

算法与程序框图

1.1.1

算法的概念

在前面的学习中，同学们已经接触到算法的概念，这一章我们专门来学习算法的知识。算法可以理解为由基本运算及规定的运算顺序所构成的完整的解题步骤，或者看成按照要求设计好的有限的确切的计算序列，并且这样的步骤或序列能够解决一类问题。

描述算法可以有不同的方式。例如，可以用自然语言和数学语言加以叙述，也可以借助形式语言(算法语言)给出精确的说明，也可以用框图直观地显示算法的全貌。

怎样才能设计出一个名副其实的算法呢？下面先从大家耳熟能详的鸡兔同笼问题谈起。

例 1 “一群小兔一群鸡，两群合到一群里，要数腿共 48，要数脑袋整 17，多少小兔多少鸡？”

解：算术方法：如果没有小兔，那么小鸡应为 17 只，总的腿数应为 $2 \times 17 = 34$ 条。但现在有 48 条腿，造成腿的数目不够是由于假定小兔的数目为 0，每有一只小兔便会增加 2 条腿，故应该有

$$\frac{48 - 17 \times 2}{2} = 7$$

只小兔，相应地，小鸡则应有 10 只。

求解鸡兔同笼问题的上述方法简单直观，却包含着深刻的算法思想。

代数方法：设有 x 只小鸡， y 只小兔，则有

$$(I) \begin{cases} x + y = 17 \\ 2x + 4y = 48 \end{cases}$$

将方程组(I)中的第一个方程的两边同乘以 -2 加到第二个方程中去，得到

$$(II) \begin{cases} x + y = 17 \\ (4 - 2)y = 48 - 17 \times 2 \end{cases}$$

解方程组(II)中的第二个方程，得 $y = \frac{48 - 17 \times 2}{4 - 2} = 7$ ，

将 y 代入第一个方程，得

$$x=17-y=17-7=10.$$

上述两种算法，都可以用来求解“鸡兔同笼”这类问题。只要给出“总头数”和“总腿数”，就可以算出鸡和兔的数量。

前面解决鸡兔同笼问题的代数解法，本质上是“消元”。代数解法是利用方程组(I)中的第一个方程来消去第二个方程中的未知数 x ，从而使该方程组(I)化为与其等价的方程组(II)，进而通过(II)的第二个方程确定 y ，再通过第一个方程确定 x 。算术解法是先假设都是鸡，本质上也是“消元”。

在实际中，很多问题都可以归结到求解二元一次方程组。下面我们用消元法来解一般的二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 & \text{①} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 & \text{②} \end{cases}$$

因为是二元一次方程组，所以方程组中 a_{11} ， a_{21} 不能同时为 0。

第一步，假定 $a_{11} \neq 0$ （如果 $a_{11} = 0$ ，可将第一个方程与第二个方程互换）， $\text{①} \times \left(-\frac{a_{21}}{a_{11}}\right) + \text{②}$ ，得到

$$\left(a_{22} - \frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}}\right)x_2 = b_2 - \frac{a_{21}b_1}{a_{11}}.$$

于是方程组可化为 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 & \text{③} \\ (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1 & \text{④} \end{cases}$

第二步，如果 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ ，解方程④得到

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}. \quad \text{⑤}$$

第三步，将⑤代入③，整理得到

$$x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}. \quad \text{⑥}$$

第四步，输出结果 x_1 ， x_2 。

如果 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = 0$ ，则从④可以看出，方程组无解或有无穷多组解。

以上解二元一次方程组的算法，叫做**高斯消去法**。

以后，我们在描述算法时，用英文 Step1, Step2, ... 来表示第一步，第二步，...，也可以简写为：S1, S2, ...。

从以上计算可以看出， $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ 是一个很重要的值，它决定了方程组是否有唯一解。

上面得到的结果⑤⑥，叫做求解二元一次方程组两个未知数的公式。利用这组公式，我们可写出解二元一次方程组的另一算法。算法步骤如下：

S1 计算 $D = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ ；

S2 如果 $D = 0$ ，则原方程组无解或者有无穷多组解；否则 ($D \neq 0$)，

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{D},$$



这里方程组的写法与以前学到的不同。方程组的未知数用 x_1 和 x_2 表示， a_{11} 表示方程组中的第一个方程第一个未知数 x_1 的系数…… a_{22} 表示第二个方程中第二个未知数 x_2 的系数， b_1 表示第一个方程的常数项， b_2 表示第二个方程的常数项。

$$x_2 = \frac{b_2 a_{11} - b_1 a_{21}}{D};$$

S3 输出计算的结果 x_1 , x_2 或者无法求解信息.

从解二元一次方程组的算法可以知道, 求解某个问题的算法不一定是唯一的. 我们现在学习的算法不同于求解一个具体问题的方法, 它有如下的要求:

(1) 写出的算法, 必须能解决一类问题(例如解任意一个二元一次方程组), 并且能重复使用;

(2) 算法过程要能一步一步执行, 每一步执行的操作, 必须确切, 不能含混不清, 而且经过有限步后能得出结果.

通过求解二元一次方程组的算法, 我们大家已初步理解了算法的含义和要求, 与你开始时的理解是否有些不同了. 下面再举个例子加以说明.

例 2 写出一个求有限整数序列中的最大值的算法.

分析 这个例子对你理解算法会有很好的帮助. 你可能会觉得, 求一个整数序列的最大值是很简单的事, 事实上也并非简单. 如果从 10 个、8 个整数中找出最大值, 你一眼就能看出结果. 如果从 100 个整数中找出最大值, 你花点时间也能够找出. 如果你要从一个 1 000 000 人的年龄序列表中找出年龄最大的一个, 要是没有算法那可就是一件困难的事了. 如果在你的计算机内已有了 100 万人口的年龄登记表, 用计算机软件转瞬间就可找出最大值. 计算机能快速找出是靠软件(程序)支持, 编写程序要依赖算法. 如何对这个问题写出一个算法呢?

解: 为了便于理解, 算法步骤用自然语言叙述:

S1 先假定序列中的第一个整数为“最大值”.

S2 将序列中的下一个整数值与“最大值”比较, 如果它大于此“最大值”, 这时你就假定“最大值”是这个整数.

S3 如果序列中还有其他整数, 重复 S2.

S4 在序列中一直到没有可比的数为止, 这时假定的“最大值”就是这个序列中的最大值.

如果让你去找, 你可能不会这样做, 可能认为, 这样太机械、太枯燥. 不要忘了, 我们写的是算法. 算法要求“按部就班地做”, 每做一步都有唯一的结果, 又要求写出的算法对任意整数序列都适用, 并且在有限步之后, 总能得出结果. 所以上面写的, 符合算法要求.

下面, 我们用数学语言, 写出对任意 3 个整数 a, b, c 求出最大值的算法, 再帮助你理解算法概念.

S1 $max = a$. (max 表示最大值, 这个式子的意思是, 假定最大值是第一个整数)

S2 如果 $b > max$, 则 $max = b$.

S3 如果 $c > max$, 则 $max = c$.

S4 max 就是 a, b, c 中的最大值.


有了算法，就可编写程序。同学们现在可能还不会编程序，没关系，大部分数学计算都已由科学家编制成应用程序。大家不妨先来感受一下这些应用程序的威力，并加深对算法作用的理解。

例 3 应用 Scilab 计算指令解方程组：

$$\begin{cases} 3x-2y=14 \\ x+y=-2 \end{cases}$$

解：用 Scilab 程序：

打开 Scilab 程序，在界面上按下图中的格式输入两个未知数的系数和常数项：



```
Scilab
文件(F) 编辑(E) 控制(C) 演示程序(D) 图形窗口(G) 帮助(H) 编辑器(I)
-->A=[3,-2;1,1];

-->B=[14;-2];

-->linsolve(A,-B)
ans =

!   2.   !
!  -4.   !
```

得到这个方程组的解是 $x=2$ ， $y=-4$ 。

不论给出的是多少个未知数的线性方程组，只要按上面的格式，在 Scilab 界面上输入给定的数据，瞬间就会输出解答。

在计算机上能够求解方程组，是由于计算机安装有计算软件，而软件的核心是算法。只要有了解决问题的算法，不管借助的工具是纸笔、计算器，还是计算机，都能按照算法步骤求得相同的结果。

思考与讨论

说出你过去和现在对“算法”一词的理解。



练习 A

1. 写出一个能找出 a, b, c, d 四个数中最大值的算法.

2. 用高斯消去法解下列二元一次方程组:

$$(1) \begin{cases} 3x-2y=-2 \\ 7x-y=18 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x+3y=3 \\ 6x+12y=11 \end{cases}$$

3. 试写出判断直线 $Ax+By+C=0$ 与圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 的位置关系的算法.

4. 用 Scilab 计算指令解下列方程组:

$$(1) \begin{cases} 3x-2y+z=-4 \\ 5x+2y-3z=12 \\ x+3y+5z=-1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x+y+z=12 \\ 3x-3y-z=16 \\ x-y-z=-2 \end{cases}$$



练习 B

1. 正三棱锥 $S-ABC$ 侧棱长为 l , 底面边长为 a , 写出求此三棱锥 $S-ABC$ 体积的一个算法.

2. 写出在下面的数字序列中, 搜索数 18 的一个算法:

2 5 7 8 15 32 18 12 8 52

3. 写出两个分数乘法的算法.

1.1.2

程序框图

1. 程序框图的概念

通常用一些通用图形符号构成一张图来表示算法. 这种图称作**程序框图**(简称**框图**). 上一小节中, 用公式法解二元一次方程组的算法可用框图形象地描述, 如图 1-1.

由此我们可以看到用框图表示算法直观、形象, 容易理解. 通常说“一图胜万言”, 就是说用框图能够清楚地展现算法的逻辑结构.

在图 1-1 的框图中有许多图形符号和连接线, 这些符号表示特定的含义, 被大家普遍采用. 下面列表给出一些常用的表示算法步骤的图形符号.




图 1-1

图形符号	名称	符号表示的意义
	起、止框	框图的开始或结束
	输入、输出框	数据的输入或者结果的输出
	处理框	赋值、执行计算语句、结果的传送
	判断框	根据给定条件判断
	流程线	流程进行的方向
	连接点	连接另一页或另一部分的框图
	注释框	帮助理解框图

下面对图形符号再作一些说明：

起、止框是任何流程不可少的，表明程序的开始和结束。输入和输出可用在算法中任何需要输入、输出的位置。例如求解方程组的框图(图 1-1)中，算法开始后第一步需要输入(给定)未知数的系数和常数项，就可把给定的数值写在输入框内，最后要给出运算的结果，把算出的两个未知数的值，写在输出框内。算法中间要处理数据或计算，可分别写在不同的处理框内，例如此例的计算 D 可写在处理框内。当算法要求你对两个不同的结果进行判断时，例如此题的判断条件为 $D=0$ ，要写在判断框内。

一个算法步骤到另一个算法步骤用流程线连接。如果一个框图需要分开来画，要在断开处画上连接点，并标出连接的号码(图 1-2)。




图 1-2

2. 画程序框图的规则

为了使大家彼此之间能够读懂各自画出的框图，必须遵守一些共同的规则，下面对一些常用的规则作一简单的介绍。

- (1) 使用标准的框图的符号。
- (2) 框图一般按从上到下、从左到右的方向画。
- (3) 除判断框外，其他框图符号只有一个进入点和一个退出点。判断框是具有超过一个退出点的唯一符号。
- (4) 一种判断框是二择一形式的判断，有且仅有两个可能结果；另一种是多分支判断，可能有几种不同的结果。
- (5) 在图形符号内描述的语言要非常简练清楚。



练习 A

1. 什么是程序框图？说出图形符号的意义。
2. 画出计算 $1+2+3+4+5$ 的程序框图。
3. (1) 画出求一个数的百分之几的程序框图；
(2) 画出已知一个数的百分率，求这个数的程序框图。



练习B

1. 写出判断两条直线 $l_1: y=k_1x+b_1$, $l_2: y=k_2x+b_2$ 是否垂直的程序框图.
2. 画出解方程组 $\begin{cases} 3x-y=5 \\ 2x+5y=8 \end{cases}$ 的程序框图.

1.1.3

算法的三种基本逻辑结构和框图表示

我们写出的算法或画出的程序框图,一定要使大家一步步地看得清楚、明白,容易阅读.不然,写的算法乱无头绪,就很难让人阅读和理解.这就要求算法或程序框图有一个良好的结构.通过对各种各样的算法和框图进行分析和研究,证明只须用顺序结构、条件分支结构和循环结构就可表示任何一个算法.用这三种基本结构表述的算法和画出的框图,整齐美观,容易阅读和理解.下面我们分别介绍这三种基本逻辑结构.

1. 顺序结构

顺序结构描述的是最简单的算法结构,语句与语句之间,框与框之间按从上到下的顺序进行.下面举例说明.

例1 已知点 $P_0(x_0, y_0)$ 和直线 $l: Ax+By+C=0$, 求点 $P_0(x_0, y_0)$ 到直线 l 的距离 d .

解: (1) 用数学语言来描述算法:

S1 输入点的坐标 x_0, y_0 , 输入直线方程的系数 A, B, C ;

S2 计算 $z_1 = Ax_0 + By_0 + C$;

S3 计算 $z_2 = A^2 + B^2$;

S4 计算 $d = \frac{|z_1|}{\sqrt{z_2}}$;

S5 输出 d .

(2) 用框图来描述算法,如图 1-3 所示.




图 1-3

2. 条件分支结构

从上面的介绍来看,一些简单的算法可以用顺序结构来表示,但是这种结构无法描述要求进行逻辑判断,并根据判断结果进行不同处理的情况.因此,需要另一种逻辑结构来处理这类问题.这种结构叫做**条件分支结构**.它是依据指定条件选择执行不同指令的控制

结构. 下面举例说明.

例 2 用数学语言和程序框图描述求一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

的根的过程.

解: (1) 用数学语言来描述算法:

S1 计算 $\Delta = b^2 - 4ac$;

S2 如果 $\Delta < 0$, 则原方程无实数解;

否则 ($\Delta \geq 0$),

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a};$$

S3 输出解 x_1, x_2 或无实数解信息.

(2) 用框图来描述算法, 如图 1-4 所示.




图 1-4

例 3 设火车托运质量为 P (kg) 的行李时, 每千米的费用(单位: 元)标准为

$$Y = \begin{cases} 0.3P, & \text{当 } P \leq 30 \text{ 时} \\ 0.3 \times 30 + 0.5(P - 30), & \text{当 } P > 30 \text{ 时} \end{cases}$$

画出计算行李托运费用的程序框图.

解: 先输入托运的质量 P 和里程 D , 再分别用各自条件下的计算式子来进行计算处理, 然后将结果与托运里程 D 相乘, 最后输出托运行李的费用 M . 程序框图如图 1-5 所示.




图 1-5



练习 A

1. 画出由直角三角形的两条直角边 a, b , 求斜边长的程序框图.
2. 画出由梯形两底 a, b 和高 h , 求梯形面积的程序框图.
3. 画出由两点的距离公式求两点距离的程序框图.
4. 画出求两个正整数相除 ($a \div b$) 的商 q 及余数 r 的程序框图.
5. 设汽车托运质量为 P (kg) 的货物时, 每千米的费用(单位: 元) 标准为

$$y = \begin{cases} 0.2 P, & \text{当 } P \leq 20 \text{ 时} \\ 0.3 \times 20 + 1.1(P - 20), & \text{当 } P > 20 \text{ 时} \end{cases}$$

画出计算货物托运费用的程序框图.



练习 B

1. 画出求一个数的绝对值的程序框图.
2. 画出一个判断任意正整数奇偶性的程序框图.
3. 画出在 a, b, c 三数中找出最大数的程序框图.
4. 在国内投寄平信, 每封信质量 x (g) 不超过 60 g 的邮费(单位: 分) 标准为

$$y = \begin{cases} 120, & x \in (0, 20] \\ 240, & x \in (20, 40] \\ 360, & x \in (40, 60] \end{cases}$$

画出计算邮费的程序框图.

3. 循环结构

在科学计算中,会遇到许多有规律的重复运算.例如:人口预测.已经知道现有的人口总数是 P ,人口的年增长率是 R ,预测第 T 年后人口总数将是多少?

问题的分析:

- (1) 第一年后的人口总数是 $P+P \times R=P(1+R)$;
- (2) 第二年后的人口总数是 $P(1+R)+P(1+R) \times R=P(1+R)^2$;
-

以此类推,得第 T 年后的人口总数是 $P(1+R)^T$.

这就是说,如果要计算第 10 年后的人口总数,乘 $(1+R)$ 的运算要重复 10 次.如果一个计算过程,要重复一系列的步骤若干次,每次重复的计算步骤完全相同,则这种算法过程称为循环过程.循环过程非常适合计算机处理,因为计算机的运算速度非常快,执行成千上万次的重复计算,只不过是一瞬间的事,且能保证每次的结果都正确.由此引出算法的第三种结构:

根据指定条件决定是否重复执行一条或多条指令的控制结构称为**循环结构**.

通过以上的分析,预测人口的算法中包含循环结构,它可用图 1-6 中的程序框图来描述.

画出这张框图的关键,是要理解

“计算增量 $I=P \times R$ ”, “ $P=P+I$ ” 及 “ $t=t+1$ ”

这三个处理框的工作.每重复(循环)一次, I , P , t 三个变量都发生变化,这三步要重复计算 T 次.它是如何工作的,大家一定要清楚.在计算增量这个处理框中,第一次算出的是第一年的增量,第二年人口计算的基数发生了变化,它已不是初始值 P ,它应是 $P+I$,因此在下一个处理框中,用 $P+I$ 代替 P ,这时输出的应是 $P+I$,可输出框中仍写的是 P ,这可能使你有点糊涂,但只要你想到 P 是一个变化着的量也就容易理解了.开始是初始值,每年后都用新的人口值替代上一年的人口值,再送回“计算增量”的处理框,计算新的一年的人口增量.你不妨把“ $P=P+I$ ”这个处理框看成一个储存数据的单元,新的数据进入就把旧的数据“赶走”.增长时间变量 t 的变化类似,每循环一次增长 1,用它来对循环次数进行计数.

例 4 已知 n 个正整数排成一行如下:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n.$$

其中下脚码表示 n 个数的排列位置.这一行数满足条件:

$$a_1=1, a_2=1, a_n=a_{n-2}+a_{n-1}. (n \geq 3, n \in \mathbf{N})$$

画出计算第 n 个数的程序框图.




图 1-6

分析 表达式 $a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$ 的意义是表示在这个数序列中的第 n 个数, 可由它前面的两个数计算出来, 如果给出这个数序列的第一和第二个数, 则这个数序列的所有项都可计算出来. 即

由 $a_1 = 1, a_2 = 1$, 可求出

$$a_3 = a_1 + a_2 = 1 + 1 = 2,$$

$$a_4 = a_2 + a_3 = 1 + 2 = 3,$$

$$a_5 = a_3 + a_4 = 2 + 3 = 5,$$

.....

$$a_k = a_{k-2} + a_{k-1}. \quad (*)$$

解: 由(*)式, 我们可看到, a_k, a_{k-2}, a_{k-1} 都是 k 的函数, 数值随 k 而变, (*)式中的计算要反复进行, 因此在框图中要引入三个变量, 分别用 C, A, B 表示 a_k, a_{k-2}, a_{k-1} . 框图中首先要输入正整数 $n(n \geq 3)$ 及给 A 与 B 分别输入值 1, 1, 然后循环计算. 它的程序框图如图 1-7 所示.

大家看到, 在这张框图中, 除引入变量 A, B, C 外, 又引入了一个变量“ k ”, 在进行循环操作前, 用这个变量控制是否达到给定的正整数 n .




图 1-7

练习 A

1. 画出求 $1+2+3+\dots+10$ 的一个算法的程序框图.
2. 画出计算 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}$ 值的一个算法的程序框图.
3. 画出对 $x=1, 2, 3, \dots, 9, 10$, 求 x^2 的算法的程序框图.

练习 B

1. 在本节人口预测的引例中, 如果令 $P=10\ 000, R=0.1, T=5$, 画出计算的程序框图.
2. 画出计算 $1^2+2^2+\dots+50^2$ 的算法的程序框图.
3. 已知函数 $f(x)=x^2$, 把区间 $[-3, 3]$ 10 等分, 画出求等分点函数值算法的程序框图.

习题 1-1 A

1. 已知摄氏温度 C 与华氏温度 F 的关系是 $F=C \times \frac{9}{5} + 32$, 写出由摄氏温度求华氏温度的算法并画出程序框图.
2. 一城市在法定工作时间内, 每小时的工资为 8 元, 加班工资每小时为 10 元. 如果某人一周内工作 60 h, 其中加班 20 h, 税率是 10%, 写出这个人净得工资的算法, 并画出算法的程序框图.
3. 画出任给一个有两位小数的实数, 对末位用“四舍五入法”, 求精确到一位小数的程序框图.
4. 画出对 $x=-3, -2.9, -2.8, \dots, 2.9, 3$, 计算函数 $y=x^2-3x+1$ 对应值的程序框图.
5. 画出计算 $1^2+2^2+3^2+\dots+99^2+100^2$ 的算法的程序框图.

习题 1-1 B

1. 写出分数 $\frac{b}{a}$ 除以分数 $\frac{d}{c}$ 的算法, 并画出程序框图.
2. 画出求 $S=1+(1+2)+(1+2+3)+\dots+(1+2+\dots+50)$ 的程序框图.
3. 写出对任意自变量 x , 求函数值 y 的算法, 并画出计算的程序框图.
 - (1) $y=\sqrt{x}$;
 - (2) $y=3\ln(x+3)$;
 - (3) $y=2^x$;
 - (4) $y=a\sin x+\cos x$.
4. 分别标有 1, 2, 3, 4, 5, 6 六个号码的小球, 有一个最重, 写出挑出此重球的算法并画出程序框图.

1.2 基本算法语句

在上一节，我们学习算法和程序框图时，就已经指出，用顺序结构、条件分支结构和循环结构就可表示任何算法。如何将算法的这些控制结构，转变成计算机能够理解的程序语言和能在计算机上实现的程序呢？现在计算机能够直接或间接理解的程序语言有很多种，这些程序语言都包含一些基本的语句结构：

输入语句 输出语句 赋值语句 条件语句 循环语句

本节我们将用“算法”的观点对这些基本语句进行分析，然后再结合“Scilab”的程序语言，帮助大家更好地理解这些语句的结构以及在解数学问题中的应用。在必修模块数学1中，我们已经介绍了数学应用软件“Scilab”，它的界面已是我们的演算板。它是完全免费自由使用的数学软件，同学们可以在我们介绍的网站上下载。在“Scilab”中，你可以进行各种数值计算，这是因为“幕后”有强大的程序在支持它。你想知道如何编出如此强大的程序吗？你想把自己的“算法”也编成程序，在计算机上运行吗？那就请你认真学习这一节的内容。这里，我们通过“Scilab”自带的编程语言，来演示实现算法的三种基本结构。这个编程语言不仅简单易用而且功能还很强。当然，你也可结合你在信息技术课上学到的任一种程序语言来学习。

下面分三个小节介绍基本算法语句结构。

1.2.1

赋值、输入和输出语句

1. 赋值语句

在表述一个算法时，经常要引入变量，并赋给该变量一个值。用来表明赋给某一个变量一个具体的确定值的语句叫做**赋值语句**。在算法语句中，赋值语句是最基本的语句。

赋值语句的一般格式为：变量名=表达式。

赋值语句中的“=”号，称做**赋值号**。赋值语句的作用是先计算出赋值号右边表达式的值，然后把该值赋给赋值号左边的变量，使该变量的值等于表达式的值。例如，在Scilab界面窗口中输入：

```
--> a=3; b=4; c=5;①
--> s=(a+b+c)/2;
--> A=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));②
```

都是赋值语句。

关于赋值语句，有以下几点需要注意：

(1) 赋值号左边只能是变量名字，而不是表达式。

例如 $3.6=X$ 是错误的。

(2) 赋值号左右不能对换。赋值语句是将赋值号右边的表达式的值赋给赋值号左边的变量，例如 $Y=X$ ，表示用 X 的值替代变量 Y 原先的取值，不能改写为 $X=Y$ 。因为后者表示用 Y 的值替代变量 X 的值。

(3) 不能利用赋值语句进行代数式（或符号）的演算（如化简、因式分解等），例如

$$y=x^2-1=(x+1)(x-1),$$

这是不能实现的。在赋值语句中的赋值号右边的表达式中的每一个“变量”都必须事先赋给确定的值。在一个赋值语句中只能给一个变量赋值。不能出现两个或多个“=”。

(4) 赋值号与数学中的等号的意义不同。赋值号左边的变量如果原来没有值，则在执行赋值语句后，获得一个值。如果原已有值，则执行该语句后，以赋值号右边表达式的值代替该变量的原值，即将原值“冲掉”。如：

$$N=N+1$$

在数学中是不成立的，但在赋值语句中，意思是将变量 N 的原值加 1 后再赋值给变量 N ，结果使变量 N 的值增加了 1。

在一些应用程序中，可以在界面窗口中直接赋值。如在 Scilab 界面窗口内赋值并计算三个数的平均数，可在窗口中输入：

```
--> a=5; b=7; c=9;
--> aver=(a+b+c)/3③
aver=
7
```

这个语句系列一共 4 行，前 2 行都是给变量赋值。后面 2 行显示了变量 $aver$ 的值。

2. 输入语句

在某些算法中，变量的初值要根据情况经常地改变。一般我们把程序和初始数据分开，每次算题时，即使初始数据改变，也不必改变程序部分，只要每次程序运行时，输入相应的数据即可。这个过程在程序语言中，用“输入语句”来控制。不同的程序语言都有自己的输入指令和方法。下面主要介绍**键盘输入语句**，并看看在 Scilab 中用什么语句来控制输入。

在 Scilab 中的输入语句之一是“input”。下面介绍它的使用方法。

先看一个例子。

假如我们要计算任一个学生的语文、数学、外语三门课的平均成绩，就要输入这个学

注

① Scilab 命令一般以分号“;”作为结尾，每输完一行都要按回车键“Enter”确认输入内容。

② sqrt 为平方根函数。本章末附录 2 给出了 Scilab 部分函数指令表。

注

③ 赋值语句后没有分号“;”结尾时，界面窗口内显示变量赋值后的结果；有分号“;”结尾时，则不显示结果。

生三门课的成绩. 在 Scilab 程序中是用“input”输入语句来控制 在屏幕上输入. 在 Scilab 的文本编辑器^①中写出如下程序:

```
a=input("chinese");           //请求输入语文的成绩,②
                                //并把此值赋值给变量 a.
b=input("math");              //请求输入数学的成绩,
                                //并把此值赋值给变量 b.
c=input("foreign language"); //请求输入外语的成绩,
                                //并把此值赋值给变量 c.
aver=(a+b+c)/3                //把表达式(a+b+c)/3 的
                                //值,赋值给变量 aver, 并
                                //在界面窗口内显示 aver 的值.
```

注

① 点击 Scilab 界面中的“Editor”菜单, 就可进入文本编辑器界面.

② “//”后面是注释内容, 对程序运行不起作用.

把程序保存在一个文件中, 例如“c:\gaobook\aver.sci”.

点击 Scilab 的文本编辑器界面内“Execute”菜单中的“Load into Scilab”按钮, 立即会在 Scilab 界面内运行:

```
--> exec('c:\gaobook\aver.sci');
```

```
chinese -->
```

这时, 你可从键盘输入一个学生的语文成绩(分), 例如, 90. 再按“Enter”键, 程序继续运行, 界面出现

```
math -->
```

这时, 你可从键盘输入一个学生的数学成绩(分), 例如, 80. 再按“Enter”键, 程序继续运行, 界面出现

```
foreign language -->
```

这时, 你可从键盘输入一个学生的外语成绩(分), 例如, 79. 再按“Enter”键, 程序继续运行, 界面出现

```
aver=83.
```

“input”在计算机程序中, 通常称为**键盘输入语句**. 从这个例子我们可以体会到“输入语句”在程序中的作用.

Scilab 的输入语句“input”, 不仅可输入数值, 也可输入单个或多个字符, 如

```
x=input("What is your name?","string");
```

```
//输入你的名字.
```

```
//string 代表输入字符型变量.
```

下面再来看我国古算术中的鸡兔同笼问题, 我们写出它的算法、框图和程序, 从中体会一下“算法”的意义以及“输入语句”的作用.

例 1 写出鸡兔同笼问题的一个算法.

解: 算法:

S1 输入鸡和兔的总数量 M ;

S2 输入鸡兔腿的总数量 N ;

S3 鸡的数量 $A = \frac{4M - N}{2}$;

S4 兔的数量 $B=M-A$.

程序框图如图 1-8 所示.

在 Scilab 的文本编辑器中编写如下程序:

```
M=input("How many heads"); //输入鸡和兔的总数量 M;
N=input("How many legs"); //输入鸡兔腿的总数量 N;
A=(4 * M - N)/2; //鸡的数量=(4 * M - N)/2;
B=M - A; //兔的数量=M - A;
A //显示鸡的数量;
B //显示兔子的数量.
```

把上述程序保存成一个文件, 然后在 Scilab 界面内执行该程序, 屏幕出现以下提示:

How many heads --> (键入头数, 例如 9)

M=9.

How many legs --> (键入腿数, 例如 26)

N=26.

结果:

A=5.

B=4.

在 Scilab 中, 还有其他输入语句, 如“read”输入语句. 在其他各种程序语言中, 一般都有自己的输入控制语句, 它们的作用是相同的, 只是每种程序语言的控制代码和表现形式不同. 这里, 我们只是帮你理解程序语句的含义, 减少你今后深入学习程序设计的困难.

3. 输出语句

任何求解问题的算法, 都要把求解的结果“输出”. 由此可知, 任何程序语言也必须有“输出语句”来控制输出. 不同的程序语言都有自己的输出语句和表现形式, 但功能是一样的, 就是以某种形式把求解结果“输出”出来. 下面, 我们以 Scilab 为例, 主要介绍屏幕显示输出.

在 Scilab 中, 有各种输出语句, 如 print, write, format, printf, disp. 下面我们仅对“print”语句举例加以说明.

例 2 一个算法是, 用 Scilab 中的 rand() 函数, 首先生成一个 0~1 之间的随机数并把它赋值给变量 a , 再把数值 3 赋值给变量 b , 把 $a+b$ 赋值给变量 c , 最后把它们都输出到屏幕上. 这个算法用 Scilab 程序写出, 并用 print(%io(2), a, b, c) 语句控制输出. 在 Scilab 界面内可直接写出程序并运行如下:

```
--> a=rand(); b=3; c=a+b; print(%io(2), a, b, c);
```

```
c=
```

```
3.7560439
```




图 1-8

b=

3.

a=

.7560439

程序中的 $\text{print}(\%io(2), a, b, c)$ 的参数 $\%io(2)$ 表示在屏幕上输出.



练习 A

本节的练习只要求写出计算程序或结果, 有条件的同学可使用带有储存功能的计算器计算或在计算机上运算.

1. 下列 Scilab 程序运行后, a, b, c 各等于多少?

(1) $a=3; b=-5; c=8; a=b; b=c;$

$\text{print}(\%io(2), a, b, c);$

(2) $a=3; b=-5; c=8; a=b; b=c; c=a;$

$\text{print}(\%io(2), a, b, c);$

2. 已知函数 $f(x)=x^3$, 求 $f(13)$.

3. 写出求平行四边形面积公式的程序:

$S=ah$ (a 为一边的长, h 为其上的高).

并写出每步程序语句的作用.

4. 任给三个正数, 求它们的算术平均数, 并写出每步程序语句的作用.



练习 B

1. 用公式法求方程 $x^2-3x+2=0$ 的两个根.

2. 用公式法解方程组 $\begin{cases} x+y=-1 \\ 3x-y=13 \end{cases}$

3. 任给一个三角形的底和高, 求这个三角形的面积.

4. 任给两点的坐标, 求这两点的距离.

1.2.2

条件语句

处理条件分支逻辑结构的算法语句, 叫做**条件语句**. 我们仍以 Scilab 自带的程序设计

语言, 对条件语句加以说明.

计算机通常是按照程序中语句出现的先后顺序依次往下执行的. 但有时需要根据某个给定条件是否满足而决定所要执行的语句, 这时就需要条件语句. Scilab 语言中的条件语句分为 if 语句和 select-case 语句. 下面我们只举例说明 if 语句的用法.

在 1.1.3 节, 我们写出了求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 根的算法和程序框图, 这里用 Scilab 程序语言写出如下程序.

```

a=input("a=");           // 输入 a, b, c 的值
b=input("b=");
c=input("c=");
d=b * b-4 * a * c;       // 计算
if d<0                    // 如果 d<0
    disp("no solution");  // 输出无解信息
else t=sqrt(d);
    x1=(-b+t)/(2 * a)     // 计算并显示 x1 的值
    x2=(-b-t)/(2 * a)     // 计算并显示 x2 的值
end

```

disp 也是 Scilab 的输出语句, 运行后在界面窗口上显示双引号中间的文字.

这个程序运行后, 第一步, 要求你输入方程中的常数 a, b, c . 第二步, 计算 d . 第三步, 用 if 语句对 d 进行判断, 如果 $d<0$, 用语句 disp 输出方程无解信息. 第四步, 否则 (else) 也就是 $d\geq 0$, 则计算并输出 x_1 和 x_2 .

从这个程序可以看到, if 语句的一般格式是:

```

if 表达式
    语句序列 1;
else
    语句序列 2;
end

```

该语句的功能为, 如果表达式结果为真, 则执行表达式后面的语句序列 1; 如果表达式结果为假, 则执行 else 后面的语句序列 2.

其实, if 语句最简单的格式是:

```

if 表达式
    语句序列 1;
end

```

这就是说, 如果表达式结果为真, 则执行表达式后面的语句序列 1, 否则跳过语句序列 1.

从上例我们可知道“条件语句”在程序语句中的作用. Scilab 中的 if 语句很简单,

不妨用它编点程序，解决你学过的一些需要条件判断的数学问题，从中体会“条件语句”的作用和使用方法。



练习 A

1. 任给一个实数，求它的绝对值。
2. 任意给三个数，求它们中的最大数。
3. 用生成随机数命令 rand() 生成一些随机数，如果生成的数大于等于 0.5，输出数 1，否则输出数 0。



练习 B

1. 任给一个正数，求它的自然对数。
2. 已知三个实数，求它们中的最小数。
3. 某商店对顾客购买货物款数满 500 元，减价 3%，不足 500 元不予优惠。输入一顾客购物的款数，计算出这个顾客实交的货款。

4. 已知函数 $y = \begin{cases} 1, & x < -1 \\ 0, & -1 \leq x \leq 1 \\ -1, & x > 1 \end{cases}$ 给出 x 的值，计算出 y 的值。

1.2.3

循环语句

在算法程序语言中一般通过循环语句来处理算法中的循环结构。我们知道，在实际问题中会遇到许多有规律的重复运算，或者在程序中需要对某些语句进行重复的执行，这就需要用到循环语句进行控制。Scilab 程序语言中提供了两种循环语句：for 循环和 while 循环。下面我们举例说明这两种循环语句的作用。

例 1 求 $1+2+3+\cdots+1\,000=?$

分析 相信大家已不会从 1 开始一次一次地做 999 次加法，来计算这道题目。大家肯定知道它的巧妙算法。这道题如果要一步步地加，即要重复做 999 次加法计算，但计算机可不怕这样的重复计算，使用循环语句来做完这样的计算，只是瞬间的事。下面用“for”循环语句写出计算程序，然后我们再对它的结构进行分析。

解：在 Scilab 中的文本编辑器中写出如下程序：

```
S=0;
for i=1: 1: 1000
S=S+i;
end
S
```

这个程序一共四步：

第一步是选择一个变量 S 表示和，并赋给初值 0。

第二步开始进入 for 循环语句，首先设 i 为循环变量，分别设定其初值、步长、终值。这里初值为 1，步长为 1（步长是指循环变量 i 每次增加的值，步长为 1，可以省略不写，若为其它值，则不可省略），终值为 1 000。

第三步为循环表达式（循环体）。

第四步用“end”控制结束一次循环，开始一次新的循环。

理解“for”循环的关键是理解第三步“ $S=S+i$ ”计算机是如何执行的。下面写出几步循环，大家可能就会理解。

$i=1$ $S=S+i$ 是 $S=S+1$ ，并把 $0+1$ 赋值给 S ，第一次循环结束 S 为 1，此时 S 记录了第一个数的值，遇到“end”开始第二次循环；

$i=2$ $S=S+i$ 是 $S=S+2$ ，并把 $1+2$ 赋值给 S ，第二次循环结束 S 为 $1+2=3$ ，此时 S 记录了前两个数的和，遇到“end”开始第三次循环；

$i=3$ $S=S+i$ 是 $S=S+3$ ，并把 $(1+2)+3$ 赋值给 S ，第三次循环结束 S 变为 $1+2+3=6$ ，此时 S 记录的是前 3 个数的和，遇到“end”开始第四次循环；

.....

把上述程序存到一个文件中（“c: /gao/intsum. sci”），点击“Execute”菜单中的“Load into Scilab”按钮，就会在 Scilab 中执行你写的程序：

```
--> exec ( "c: /gao/intsum. sci");
```

S=

500500.

如果在程序的第三行语句后，去掉分号，再运行程序，可在屏幕上显示每一步循环输出的结果，如前 5 步的循环的结果为：

S=

1.

S=

3.

S=

6.

S=

10.

S=

15.

for 循环的格式为

```
for 循环变量=初值:步长:终值
    循环体;
end
```

Scilab 中的第二种循环语句是 while 语句, 它的格式为

```
while 表达式
    循环体;
end
```

这种循环结构, 首先要求对表达式进行判断, 如果表达式为真, 则执行循环体部分, 每次开始执行循环体前, 都要判断表达式是否为真, 这样重复执行, 一直到表达式为假时, 就跳过循环体部分, 结束循环.

例 2 求平方值小于 1 000 的最大整数.

解: 在 Scilab 界面内, 可直接输入程序, for(while) 循环语句可以写在同一行, 但在循环条件后面一定要用“,”号分开, 也可以分行写, 最后要记住加 end. 下面直接在 Scilab 界面内, 用 while 循环语句求解这道题.

```
--> j=1;
--> while j * j < 1000, j=j+1; end
--> j=j-1;
--> j
    j=
    31.
```

在输入完程序的第三行后, 击 Enter 键, 再在提示符下输入 j, 击 Enter 键后, 输出最大的 j 值.

例 3 一球从 100 m 高度落下, 每次落地后反跳回原高度的一半, 再落下. 在第 10 次落地时, 共经过多少路程? 第 10 次下落多高?

解: 算法分析:

第 1 次下落的高度 $h_1 = 100$;

第 2 次下落的高度 $h_2 = \frac{100}{2} = 50$;

.....

第 10 次下落的高度 $h_{10} = \frac{h_1}{2^9}$. 得到递推公式为

$$h_1 = 100, h_{n+1} = \frac{h_n}{2}, n = 1, 2, \dots, 9.$$

到第 10 次落地时, 共经过了 $h_1 + 2h_2 + \cdots + 2h_{10}$ (m).

由以上分析, 可写出 Scilab 程序如下:

```
S=0;
h=100;
S=S+h;
for i=2: 10, h=h/2; S=S+2 * h; end
S
h
```

运行该程序后, 输出结果为

S=

299.60938

h=

.1953125



练习 A

1. 求 $1+2+3+\cdots+10$, 并显示每次循环结果, 并写出程序中每一步的作用.
2. 求小于 100 的所有正偶数的和.
3. 计算 $300 \times (1+0.05)^8$.
4. 求 $0.1+0.2+0.3+\cdots+0.9+1$.



练习 B

1. 求小于 100 的所有正奇数的和. 求出一共进行了多少次循环, 并显示前 5 次循环结果.
2. 求所有立方小于 10 000 的正整数.
3. 求 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$.
4. 计算 $1+2+2^2+2^3+\cdots+2^{63}$.

习题 1-2 A

- 任给三个变量 a, b, c 赋值, 求下列算式的值:
 - $a+b+c$;
 - $4a+b+3c$;
 - b^2-4ac ;
 - $(a+b)\div c$.
- 任给一个自变量的值, 求下列函数值:
 - $f(x)=3x^4-5x^3+1$;
 - $f(x)=x^5-x^2$.
- 已知圆半径为 10.945, 求圆的面积.
- 求所有平方后小于 1 000 的正整数.
- 已知 m, n 是两个正整数, 求满足 $m+n<10$ 的所有正整数对 m, n .

习题 1-2 B

- 任给一个圆锥的底面半径 r 和高 h , 求圆锥的体积 V .
- 设个人月收入在 5 000 元以内的所得税的税率档次为(单位: 元):

$0 < x \leq 1\ 000$	0%
$1\ 000 < x \leq 3\ 000$	10%
$3\ 000 < x \leq 5\ 000$	25%

请您设计一算法, 输入某人的月收入, 计算他应交的个人收入所得税, 并画出相应框图.
- 求 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$.

1.3

中国古代数学中的算法案例

同学们是否知道，我们在小学、中学学到的算术、代数，从记数到多元一次联立方程组以及方程的求根方法，都是我国古代数学家最先创造的，有的比其他国家早几百年甚至上千年。我国人民在长期的生活、生产和劳动过程中，创造了整数、分数、小数、正负数及其计算，以及无限逼近任一实数的方法。在代数学、几何学方面，我国在宋、元之前也都处于世界的前列。更为重要的是我国古代数学的发展有着自己鲜明的特色，走着与西方完全不同的道路，在今天看来这条道路仍然有很大的优越性。这条道路的一个重要特色就是“寓理于算”，也就是本节中所讲的要把解决的问题“算法化”。下面我们举一些我国古代数学中算法的例子，让同学们更进一步体会“算法”的概念，看一看中国古代数学的伟大成就和显著特色。

1. 求两个正整数最大公约数的算法

我们知道，如果整数 a 能被整数 b 整除，则 b 称为 a 的一个约数。一个整数可能有好几个约数。例如，12 能被 1, 2, 3, 4, 6, 12 整除，这 6 个数都是 12 的约数。16 有 1, 2, 4, 8, 16 这 5 个约数。我们看到 2 和 4，既是 12 的约数又是 16 的约数，2 和 4 叫做 12 和 16 的公约数，公约数 2 和 4 中，4 最大，4 称做 12 和 16 的最大公约数。如何找到一种算法，对任意两个正整数都能求出它们的最大公约数呢？下面给出我国古代数学家的一个算法，这个算法被称做“更相减损之术”。我们以求 16, 12 这两个数的最大公约数为例加以说明。用两数中较大的数减去较小的数，即 $16 - 12 = 4$ ，用差数 4 和较小的数 12 构成新的一对数，对这一对数再用大数减小数，以同样的操作一直做下去，直到产生一对相等的数，这个数就是最大公约数。整个操作如下：

$$(16, 12) \rightarrow (4, 12) \rightarrow (4, 8) \rightarrow (4, 4).$$

4 是 12 和 16 的最大公约数。

这种算法的道理何在呢？不难看出，对任意两个数，每次操作后所得的两数与前两数具有相同的最大公约数，而两数的值逐渐减小，经过有限步地操作后，总能得到相等的两个数，即求得两数的最大公约数。

例如，求 78 和 36 的最大公约数，操作如下：

$$(78, 36) \rightarrow (42, 36) \rightarrow (6, 36) \rightarrow (6, 30) \rightarrow \\ (6, 24) \rightarrow (6, 18) \rightarrow (6, 12) \rightarrow (6, 6).$$

这种算法，只做简单的减法，操作方便、易懂，也完全符合算法的要求，它完全是机械的运算，据此很容易编出程序，在计算机上运算。把这个算法与我们下面探索与研究介绍的欧几里得算法比较，看看这个算法的优越性。下面是我们用 Scilab 编出的程序，供大家参考。实际上，你可用你在信息技术课上学到的任一种程序设计语言编出程序，从中体会一下这个算法的优越性。为了方便叙述，我们称这种算法为“等值算法”。

用“等值算法”求最大公约数的程序：

```
a=input("please give the first number");
b=input("please give the second number");
while a<>b
    if a>b
        a=a-b;
    else
        b=b-a;
    end
end
print(%io(2), a, b);
```

把这个程序保存成文件，可随时调入 Scilab 界面运行，求任意两个正整数的最大公约数。



探索与研究

古希腊求两个正整数的最大公约数的方法是辗转相除法（即欧几里得算法）：用较大的数除以较小的数所得的余数和较小的数构成新的一对数，继续做上面的除法，直到大数被小数除尽，这个较小的数就是最大公约数。以求 288 和 123 的最大公约数为例，操作如下：

$$(288, 123) \rightarrow (42, 123) \rightarrow (42, 39) \rightarrow (3, 39).$$

想一想这种算法的道理。试着编写程序在计算机上实现。

2. 割圆术

我国魏晋时期的数学家刘徽，他在注《九章算术》中采用正多边形面积逐渐逼近圆面积的算法计算圆周率 π ，用刘徽自己的原话就是“割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆合体而无所失矣。”他的思想后来又得到祖冲之的推进和发展，计算出圆周率的近似值在世界上很长时间内处于领先地位。

刘徽从圆内接正六边形开始，让边数逐次加倍，逐个算出这些圆内接正多边形的面积，从而得到一系列逐渐递增的数值，来一步一步地逼近圆面积，最后求出圆周率的近似

值. 可以想象, 在当时需要付出多么艰辛的劳动. 现在让我们用刘徽的思想, 使用计算机求圆周率的近似值. 计算机最大的特点是运算速度快, 只要我们将运算规律告诉计算机, 计算机就会迅速得到所求的答案.

我们先对单位圆内接正六边形、正十二边形、正二十四边形……的面积之间的关系进行分析, 找出它们之间的递增规律.

如图 1-9 所示. 假设圆的半径为 1, 面积为 S , 圆内接正 n 边形面积为 S_n , 边长为 x_n , 边心距为 h_n . 根据勾股定理, h_n

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{x_n}{2}\right)^2}.$$

正 $2n$ 边形的面积为正 n 边形的面积 S_n 再加上 n 个等腰三角形 (ADB) 的面积和, 即

$$S_{2n} = S_n + n \cdot \frac{1}{2} \cdot x_n (1 - h_n). \quad \textcircled{1}$$

$$\text{正 } 2n \text{ 边形的边长为 } x_{2n} = \sqrt{\left(\frac{x_n}{2}\right)^2 + (1 - h_n)^2}.$$

刘徽割圆术还注意到, 如果在内接 n 边形的每一边上, 作一高为 CD 的矩形, 就可得到

$$S_{2n} < S < S_{2n} + (S_{2n} - S_n). \quad \textcircled{2}$$

这样, 我们就不仅可计算出圆周率的不足近似值, 还可计算出圆周率的过剩近似值.

从正六边形的面积开始计算, 即 $n=6$, 则正六边形的面积 $S_6 = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4}$. 用上面的公式

①重复计算, 就可得到正十二边形、正二十四边形……的面积. 因为圆的半径为 1, 所以随着 n 的增大, S_{2n} 的值不断趋近于圆周率, 这样不断计算下去, 就可以得到越来越精密的圆周率近似值. 下面我们根据刘徽割圆术的算法思想, 用 Scilab 语言写出求 π 的不足近似值的程序:

```
n=6;
x=1;
s=6 * sqrt(3)/4;
for i=1:1:5①
    h=sqrt(1-(x/2)^2);
    s=s+n * x * (1-h)/2;
    n=2 * n;
    x=sqrt((x/2)^2+(1-h)^2);
end
print(%io(2), n, s);
```

注

①此处 i 的终值为 5, 当 i 的终值为 1, 2, … 时, 程序分别算出正十二边形、正二十四边形……的面积.



刘徽割圆的弧田图




图 1-9

运行程序, 当边数为 192 时, 就可以得到刘徽求得的圆周率的近似值 3.14, 当边数为 24 576 时, 就得到了祖冲之计算的结果 3.141 592 6. 由于是用圆内接正多边形逼近圆, 因而得到的圆周率总是小于 π 的实际值. 作为练习, 请同学编出程序求

$$S_{2n} + (S_{2n} - S_n) \quad (n=6, 12, \dots)$$

作为 π 的过剩近似值.



探索与研究

同学们可以用同样的思想用圆外切正多边形的周长逼近圆的周长的方法求出圆周率的近似值. 请你试着写出程序, 并想一想怎样来给出 π 的一个较准确的范围.

3. 秦九韶算法

已知一个一元 n 次多项式函数

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

当 $x = x_0$, 我们可按顺序一项一项地计算, 然后相加, 求得 $P(x_0)$. 下面看看我国宋代(约 13 世纪)大数学家秦九韶是如何计算多项式函数值的.

让我们以 5 次多项式函数为例加以说明. 设

$$f(x) = a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$

首先, 我们把这个多项式一步步地进行改写:

$$\begin{aligned} f(x) &= (a_5 x^4 + a_4 x^3 + a_3 x^2 + a_2 x + a_1)x + a_0 \\ &= ((a_5 x^3 + a_4 x^2 + a_3 x + a_2)x + a_1)x + a_0 \\ &= (((a_5 x^2 + a_4 x + a_3)x + a_2)x + a_1)x + a_0 \\ &= (((a_5 x + a_4)x + a_3)x + a_2)x + a_1)x + a_0. \end{aligned}$$

上面的分层计算, 只用了小括号, 计算时, 首先计算最内层的括号, 然后由内向外逐层计算, 直到最外层的一个括号, 然后加上常数项.

这种算法与直接计算比较, 有什么优越性呢? 首先, 这种算法一共做了 5 次乘法, 5 次加法, 与直接计算相比大大节省了乘法的次数, 使计算量减少, 并且逻辑结构简单. 大家是否知道, 在计算机上做一次乘法所需要的时间是做加法、减法的几倍到十几倍, 减少做乘法的次数也就加快了计算的速度. 另外这种算法还避免了对自变量 x 单独做幂的计算, 而是与系数一起逐次增长幂次, 从而可提高计算的精度.

对任意一元 n 次多项式, 类似地叙述如下:

首先将多项式改写为

$$\begin{aligned} P(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \\ &= (a_n x^{n-1} + a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1)x + a_0 \\ &= (((a_n x^{n-2} + a_{n-1} x^{n-3} + \dots + a_2)x + a_1)x + a_0 \end{aligned}$$

$$= (\cdots ((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \cdots + a_1)x + a_0.$$

$$\text{令 } v_k = (\cdots (a_n x + a_{n-1})x + \cdots + a_{n-(k-1)})x + a_{n-k},$$

则递推公式为:

$$\begin{cases} v_0 = a_n \\ v_k = v_{k-1}x + a_{n-k} \end{cases} \quad \text{其中 } k = 1, 2, \cdots, n$$

所谓递推,就是在一系列数中已知第一个数,则其后的每一个数都可由前面的数求出.根据上面的递推公式,我们可由 v_0 依次求出所有的 v_k :

$$v_1 = v_0 x + a_{n-1}, \quad v_2 = v_1 x + a_{n-2}, \quad v_3 = v_2 x + a_{n-3},$$

.....

$$v_k = v_{k-1}x + a_{n-k},$$

.....

$$v_n = v_{n-1}x + a_0.$$

上面的方法,现在大家称它为秦九韶方法.直到今天,这种算法仍是世界上多项式求值的最先进的算法.

这种方法的计算量仅为:乘法 n 次,加法 n 次.我们看看其他算法的计算量.

用直接求和法,直接计算多项式 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 各项的值,然后把它们相加.可知乘法的次数为

$$1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2},$$

加法次数为 n .

逐项求和法在直接求和法的基础上作了改进,先把多项式写成

$$a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x^1 + a_0$$

的形式.这样多项式的每一含 x 的幂的项都是 a_k 与 x^k 的乘积($k=1, 2, \cdots, n$).在计算 $a_k \cdot x^k$ 项时把 x^k 的值保存在变量 c 中.求 $a_{k+1} \cdot x^{k+1}$ 项时只须计算 $a_{k+1} \cdot x \cdot c$, 同时把 $x \cdot c = x^{k+1}$ 的值存入 c 中,继续下一项的运算,然后把这 $n+1$ 项的值相加.

容易看出逐项求和法所用乘法的次数为 $2n-1$, 加法次数为 n . 当 $n \geq 3$ 时,

$$n < 2n-1 < \frac{n(n+1)}{2}.$$

通过上面的比较,我们可看到秦九韶算法比其他算法优越得多.



探索与研究

怎样根据上面逐项求和法的算法描述写出算法步骤.

例 用秦九韶方法求多项式

$$f(x) = 1 + x + 0.5x^2 + 0.166\ 67x^3 + 0.041\ 67x^4 + 0.008\ 33x^5$$

在 $x = -0.2$ 的值.

解: $x = -0.2$,

$$a_5 = 0.008\ 33 \quad v_0 = a_5 = 0.008\ 33$$

$$a_4 = 0.041\ 67 \quad v_1 = v_0 x + a_4 = 0.04$$

$$a_3 = 0.166\ 67 \quad v_2 = v_1 x + a_3 = 0.158\ 67$$

$$a_2 = 0.5 \quad v_3 = v_2 x + a_2 = 0.468\ 27$$

$$a_1 = 1 \quad v_4 = v_3 x + a_1 = 0.906\ 35$$

$$a_0 = 1 \quad v_5 = v_4 x + a_0 = 0.818\ 73$$

所以 $f(-0.2) = 0.818\ 73$.

秦九韶用上述多项式求值的算法, 并通过减根变换, 给出了求高次代数方程根的完整算法. 这一成就要比西方同样的算法早五六百年. 这样的算法很容易在计算器或计算机上实现.

下面介绍依据我国古代算法思想在计算机上求函数(图 1-10)

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

的近似根(设根的精确度为 d).

这里我们用数学语言写出算法:

S1 给定自变量的一个初值 x_0 , 给定自变量的初始增量 $c(c > 0)$.

S2 用秦九韶方法计算出 $f(x_0)$.

S3 若 $f(x_0) < 0$,

计算 $f(x_i + c)$, $i = 0, 1, 2, \dots$;

(1) 若 $f(x_i + c) < 0$, 则 $x_{i+1} = x_i + c$;

(2) 若 $f(x_i + c) > 0$, 则 $c = 0.1c$;

直到 $f(x_i + c) = 0$ 或 $c < d$. 这时

$$x = x_i + c$$

为方程的一个根.




图 1-10

思考与讨论

如果初值使 $f(x_0) > 0$, 那么上面的算法应做怎样的修改? 试着给出不同的初值, 看看得到的根是否相同.

习题 1-3 A

1. 用“等值算法”, 求下列两数的最大公约数:


- (1) 80, 36; (2) 294, 84; (3) 176, 88.
2. 用框图和程序语句两种方法表示用“等值算法”计算两个正整数的最大公约数.
3. 用框图和程序语句两种方法表示秦九韶的多项式求值算法.
4. 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, 用秦九韶方法计算:
- (1) 当 $x = -10, -9, \dots, 10$ 时相应的函数值 $f(x)$;
- (2) 函数 $f(x)$ 的图象与 x 轴交点的坐标.

习题 1-3 B

写一篇学习中国古代数学算法案例的体会.

本章小结

I 知识结构



II 思考与交流

1. 举一个简单的例子，说明什么是算法，并用框图和程序语言表达。
2. 算法的三种基本逻辑结构是什么？它们用来描述什么样的过程？试举例说明。
3. 试举一个例子，可以用具有三种逻辑结构的算法来描述。
4. 什么是赋值语句？写赋值语句应该注意什么？
5. 输入语句和输出语句的功能是什么？
6. 条件语句处理什么样的逻辑结构？举例说明。
7. 用什么语句处理循环结构？有几种方式？各举一例说明。
8. 中国古代数学发展的特色是什么？请同学们从图书馆、互联网上查找资料，写一篇综述。

III 巩固与提高

以下各题要求写出算法分析和程序.

1. 计算下列函数值:

(1) 已知函数 $f(x) = x^2 + 3x - 7$, 求 $f(64)$;

(2) 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$, 求 $f(12)$.

2. 求方程 $x^2 - 7x + 12 = 0$ 的两根 x_1 和 x_2 .

3. 给定 x 的任一个值, 求函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 的值.

4. 已知直角三角形的一条直角边和这条边所对的角, 求另一直角边和斜边.

5. 给定任一 x 值, 求 y 的值:

$$(1) y = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}$$

$$(2) y = \begin{cases} (x-1)^2, & x \leq 0 \\ (x+1)^2, & x > 0 \end{cases}$$

IV 自测与评估

1. 给定 x 的任一个值 (单位: 度), 求函数 $f(x) = \cos x$ 的值.

2. 求任意四个正数的平均数.

3. 根据下面的公式写出求梯形面积的程序:

$$S = \frac{1}{2}(a+b)h \quad (a, b \text{ 为上、下底, } h \text{ 为高}).$$

4. 写出已知一直角三角形的斜边和一锐角, 求两条直角边的计算程序.

5. 任给三个数, 按大小顺序排列这三个数.

6. 把区间 $[-2, 2]$ 分成 10 等份, 求函数 $f(x) = x^3$ 在各分点的值.

7. 百钱买百鸡问题: 用 100 元买 100 只鸡, 其中公鸡每只 5 元, 母鸡每只 3 元, 小鸡 3 只 1 元, 问能买多少只公鸡? 多少只母鸡? 多少只小鸡?

(提示: 设买 x 只公鸡, y 只母鸡, 则买小鸡的只数 $z = 100 - x - y$. 100 元买公鸡最多买 20 只, 买母鸡最多买 33 只.)



我国古代数学家秦九韶

秦九韶，现四川省安岳人。他生活的年代大约在 1202—1261 年，处于南宋时代。他自幼聪敏，多才多艺，喜爱数学、天文、文学和工程问题。他擅长骑马、射箭，青年时期当过军官。他的父亲是南宋管理“工程”的官员，这使他有接触天文历法、数学和工程学等方面的书籍以及研究人员，从中学天文和数学知识。他勤奋好学，在数学研究方面，取得了巨大的成绩。他的代表作《数书九章》是我国 13 世纪数学成就的代表作之一。书中的一次同余式（大衍求一术）和高次方程的解法（正负开方术）比西方欧拉和霍纳等数学家的解法要早 500 多年。由于他和他同时代的其他数学家的贡献，使我国数学在当时处于世界领先地位。他是中国人的骄傲。

《数书九章》是一部有二十多万字的科学巨著。书中共分九大类，列出 81 道题。有趣的是，从作者的名字、书名到题目共四个“九”，即“九韶”、“九章”、“九类”、“九题”。这部书的每一题都有“术”，即都有解题的原理和解题步骤，它继承了我国数学发展的突出特色：算法化。这部书的另一重要特色是理论联系实际。书中大多数问题都是来自实际。秦九韶对当时的生产和生活的各种问题进行了深刻的思考，并将它们抽象为数学问题，研究这些问题的算法。这部书凝聚着秦九韶艰辛的劳动，它在中国和世界数学史中都占有重要的地位。最值得称赞的是，秦九韶创造的一些算法（例如，多项式求值的方法）至今仍是世界上最好的算法。

东方数学的使命

中国科学院院士 吴文俊^①

一提到科学或者数学，脑子里想到的就是以欧美为代表的西方科学和数学。我要讲的是，除了以西方为代表的科学和数学之外，事实上还有跟它们完全不同的所谓东方科学与数学。这个意见也不是我第一次这样讲，在《中国科学技术史》这一宏篇巨著里面就已经介绍了这一点。李约瑟在著作里

讲，东方不仅有科学和数学，而且跟西方走的是完全不同的道路，有不同的思想方法，究竟怎么不一样呢？

所谓东方数学，就是中国的古代数学及印度的古代数学。东西方数学的异同，也就是现在欧美的数学跟东方数学（主要是古代的中国数学）有什么异同。我们学现代数学

^① 吴文俊，1919 年生于上海，1940 年毕业于上海交通大学数学系。1946 年赴法国留学，1949 年获博士学位。1957 年被选为中国科学院学部委员（院士）。1990 年被第三世界科学院选为院士。

(也就是西方数学),主要内容是证明定理;而中国的古代数学根本不考虑定理不定理,没有这个概念,它的主要内容是解方程。我们着重解方程,解决各式各样的问题,着重计算,要把计算的过程、方法、步骤说出来。这个方法步骤,用现在的话来讲,就相当于所谓算法。美国一位计算机数学大师说,计算机数学即是算法的数学。中国的古代数学是一种算法的数学,也就是一种计算机的数学。进入到计算机时代,这种计算机数学或者是算法的数学,刚巧是符合时代要求,符合时代精神的。从这个意义上来讲,我们最古老的数学也是计算机时代最适合、最现代的数学。这是我个人的一种看法。

我们再来说一下东方数学,也就是中国古代数学的精神实质是什么。我们古代数学的精髓就是从问题出发的精神,和西方的从公理出发完全不一样。为了从问题出发,解决各式各样的问题,就带动了理论和方法的发展。从问题出发,以问题带动学科的发展,这是整个数学发展的总的面貌。

为什么解决问题要解方程呢?原因很简单:一个问题有原始的数据,要求解决这个问题得出答案,这个答案也应以某种数据的形式来表示。在原始数据和要求数据之间,有某种形式的关系,这种由已知数和未知数建立起来的关系就是一种方程。为了解决形形色色的问题,就要解决形形色色的方程。因此,解方程变成中国两千多年历史发展中主要的目标所在。

我想特别提到一点,就是我们经常跟着外国人的脚步走。我们往往花很大的力气从事某种猜测的研究,希望能够解决或者至少

推进一步。可是不管你对这个猜测证明也好,推进也好,提出这个猜测的人,就好比老师出了一个题目,即使你把它解决了,也无非是把老师的题目做出来,还是低人一等,出题目的老师还是高你一等。在计算机时代,这个问题值得思考。当然,不管谁提出来这样的问题,我们都应想办法对其有所贡献,可是不能止步于此,我们应该出题目给人家做,这个性质是完全不一样的。

我们正在进入计算机时代,计算机只能处理有限的问题,所以相应的数学应该是一种处理有限事物的数学,在数学上叫“组合数学”。历史上,组合数学创始于中国,以贾宪为首,一系列的成就不断涌现。我们在数学方面得到许多这样的成就绝不是偶然的。东方的数学有一定的思考方法,是有计划、有步骤、有思想地进行的。具体地讲,它有一个基本的模式,就是从实际问题出发,形成一些新的概念,产生一些新的方法,再提高到理论上,建立一般的原理(就像牛顿有关的定理),用这样的原理解决形形色色更复杂、更重要、更艰深的实际问题,这样数学就不断地上升和发展。这就是古代数学发展的大致理论体系。

我们现在拥有计算机这样的便捷武器,又拥有切合计算机时代使用的古代数学。怎样进行工作,才能对得起古代的前辈,建立起我们新时代的新数学,并在不远的将来,使东方的数学超过西方的数学,不断地出题目给西方做,我想,这是值得我们大家思考和需要努力的方面。

(本文摘编自中国科学家人文论坛)

附录 1

解三元一次方程组的算法、框图和程序

写出解如下三元一次方程组的算法、框图和程序分析：

$$(I) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 8 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

分析 我们用高斯消去法来解这个三元一次方程组，先用第一个方程消去第二个、第三个方程中的未知数 x_1 ，具体做法是：把第一个方程乘以 -2 加到第二个方程上，把第一个方程乘以 $-\frac{1}{2}$ 加到第三个方程上，得到

$$(II) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 8 \\ -3x_2 + 10x_3 = -12 \\ \frac{3}{2}x_2 + 3x_3 = -3 \end{cases}$$

接着用 (II) 中第二个方程消去第三个方程的未知数 x_2 ，具体做法是：把第二个方程乘以 $\frac{1}{2}$ 加到第三个方程上，得到

$$(III) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 8 \\ -3x_2 + 10x_3 = -12 \\ 8x_3 = -9 \end{cases}$$

现在可以很容易就求出方程组的解。做法是：由 (III) 中第三个方程求出 $x_3 = -\frac{9}{8}$ ，把 $x_3 = -\frac{9}{8}$ 代入第二个方程得到 $x_2 = \frac{1}{4}$ ，把 x_3, x_2 的值代入第一个方程得到 $x_1 = \frac{13}{8}$ 。

由方程组 (I) \rightarrow (II) 和 (II) \rightarrow (III) 的过程叫做**消元过程**，求方程组解的过程叫做**回代过程**。消元过程实质是对方程组的系数和常数项作运算。我们把上面的方程组 (I) (II) (III) 的系数和常数项分别排成一个表，上面的消元过程就可以表示为：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 & 8 \\ 4 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{第一行} \times (-\frac{1}{2}) \text{加到第三行}]{\text{第一行} \times (-2) \text{加到第二行}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -3 & 10 & -12 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第二行} \times \left(\frac{1}{2}\right) \text{ 加到第三行}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -3 & 10 & -12 \\ 0 & 0 & 8 & -9 \end{pmatrix}$$

对于一般的三元一次方程组

$$(IV) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

的消元过程, 可以表示为:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} \text{第一行} \times \left(-\frac{a_{21}}{a_{11}}\right) \text{ 加到第二行} \\ \text{第一行} \times \left(-\frac{a_{31}}{a_{11}}\right) \text{ 加到第三行} \end{array}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ 0 & \bar{a}_{22} & \bar{a}_{23} & \bar{b}_2 \\ 0 & \bar{a}_{32} & \bar{a}_{33} & \bar{b}_3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第二行} \times \left(-\frac{\bar{a}_{32}}{\bar{a}_{22}}\right) \text{ 加到第三行}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ 0 & \bar{a}_{22} & \bar{a}_{23} & \bar{b}_2 \\ 0 & 0 & \bar{a}_{33} & \bar{b}_3 \end{pmatrix}$$

上面的消元过程要求 a_{11} , \bar{a}_{22} , \bar{a}_{33} 均不为 0. 然后通过回代过程即可求得 x_3 , x_2 , x_1 . 把上面的消元过程和回代过程描述为算法, 就可以根据算法编出程序在计算机上求解一般的三元一次方程组. 下面是用高斯消去法求解三元一次方程组的算法描述:

S1 输入 a_{11} , a_{12} , a_{13} , b_1 , a_{21} , a_{22} , a_{23} , b_2 , a_{31} , a_{32} , a_{33} , b_3 .

消元过程

S2 对于变量 $k=1, 2$ 循环:

判断 a_{kk} 是否为 0, 如果 $a_{kk} \neq 0$ 则继续程序, 如果 $a_{kk} = 0$, 情况比较复杂, 这里不作具体分析, 直接结束程序.

对于变量 $i=k+1, k+2, \dots, 3$ 循环:

(1) $c = -a_{ik}/a_{kk}$;

(2) 对于变量 $j=k+1, k+2, \dots, 3$ 循环:

$$a_{ij} = a_{ij} + c \cdot a_{kj};$$

(3) $b_i = b_i + c \cdot b_k$.

回代过程

S3 如果 $a_{33} \neq 0$ 则 $x_3 = b_3/a_{33}$, 否则结束程序.

S4 对于变量 $l=2, 1$ 循环:

(1) $S=0$;

(2) 对于变量 $m=l+1, \dots, 3$ 循环:

$$S = S + a_{lm} \cdot x_m;$$

(3) $x_l = (b_l - S) / a_{ll}$.

S5 输出 x_1, x_2, x_3 的值.

算法框图如图 1-11 所示. 为了使初学者更好地理解程序语句的作用, 这里只给出了算法的主体部分, 对于方程组无解或有无穷多解的情况未做讨论.




图 1-11

下面给出了求解一般三元一次联立方程组的程序，供有兴趣的同学参考。

```

write(%io(2), "please input the data at this format !");
write(%io(2), "--> a11 a12 a13");
write(%io(2), "--> a21 a22 a23");
write(%io(2), "--> a31 a32 a33");
write(%io(2), "--> b1 b2 b3");
[a]=read(%io(1), 3, 3);
[b]=read(%io(1), 1, 3);
    
```

```

for k=1:2
    t=abs(a(k,k));
    m=k;
    for i=k+1:3
        if abs(a(i,k))>t then t=abs(a(i,k));m=i;end
    end
    if t<1e-6 then print(%io(2),"no solution or ununique solution",t);abort;end
    if m<>k
        for i=k:3
            c=a(m,i);a(m,i)=a(k,i);a(k,i)=c;
        end
        c=b(m);b(m)=b(k);b(k)=c;
        end
        for i=k+1:3
            c=-a(i,k)/a(k,k);
            for j=(k+1):3
                a(i,j)=a(i,j)+c * a(k,j);
            end
            b(i)=b(i)+c * b(k);
        end
    end
end
if a(3,3)<1e-6 then print (%io(2),"no solution or ununique solution");
abort;end
x(3)=b(3)/a(3,3);
for k=2:-1:1
    s=0;
    for i=(k+1):3
        s=s+a(k,i) * x(i);
    end
    x(k)=(b(k)-s)/a(k,k);
end
print(%io(2),x);

```

上面的算法和程序可以很方便地修改为对 n 元一次线性方程组都适用, 这正体现了算法的要求——程序化并且能够解决一类问题. 想想看, 你能否把上面的程序改为能够求解任意元的线性方程组.

附录 2

Scilab 部分函数指令表

本指令表只收集了部分常用指令，有关全部指令请参照文档文件。

1. 通用指令

help	在线帮助
ans	缺省变量名以及最新表达式的运算结果
clear	从内存中清除变量和函数
exit	关闭 Scilab
quit	退出 Scilab
save	把内存变量存入磁盘
exec	运行脚本文件
who	列出工作内存中的变量名
editor	文本编辑器
type	变量类型
what	列出 Scilab 基本命令
format	设置数据输出格式
chdir	改变当前工作目录
getenv	给出环境值
mkdir	创建目录
pwd	显示当前工作目录
evstr	执行表达式


2. 运算符和特殊算符

+	加
-	减
*	矩阵乘
.*	数组乘
.	矩阵乘方
.^	数组乘方
\	反斜杠或左除
/	斜杠或右除
./或\	数组除
==	等号
~=	不等号
<	小于
>	大于

<=	小于或等于
>=	大于或等于
&, and	逻辑与
, or	逻辑或
~, not	逻辑非
:	冒号
()	圆括号
[]	方括号
{ }	花括号
.	小数点
,	逗号
;	分号
//	注释号
=	赋值符号
'	引号
ans	最新表达式的运算结果
%i	虚数单位 = $\sqrt{-1}$
%inf	正无穷大
%pi	圆周率, $\pi=3.141\ 592\ 653\ 589\ 7\dots$
%f	布尔值假
%t	布尔值真
3. 编程语言结构	
abort	中止计算或循环
break	终止最内循环
case	同 select 一起使用
continue	将控制转交给外层的 for 或 while 循环
else	同 if 一起使用
elseif	同 if 一起使用
end	结束 for, while, if 语句
for	按规定次数重复执行语句
if	条件执行语句
otherwise	可同 switch 一起使用
pause	暂停模式
return	返回
select	多个条件分支
then	同 if 一起使用
while	不确定次数重复执行语句
function	函数文件头
global	定义全局变量
isglobal	检测变量是否为全局变量

error	显示错误信息
lasterror	显示最近的错误信息
sprintf	按格式把数字转换为串
warning	显示警告信息
4. 基本数学函数	
acos	反余弦
acot	反余切
asin	反正弦
atan	反正切
cos	余弦
cotg	余切
sin	正弦
tan	正切
exp	指数
log	自然对数
log10	常用对数
log2	以 2 为底的对数
sqrt	平方根
abs	绝对值
conj	复数共轭
imag	复数虚部
real	复数实部
ceil	向上(正无穷大方向)取整
fix	向零方向取整
floor	向下(负无穷大方向)取整
round	四舍五入取整
sign	符号函数
double	将整数转换为双精度浮点数
5. 输入输出函数	
diary	生成屏幕文本记录
disp	变量显示
file	文件管理
input	用户键盘输入
load	读已存的变量
print	将变量记录为文件
read	读矩阵变量
save	将变量存为二进制文件
write	按格式存文件
6. 基本绘图函数	
plot2d	直角坐标图

bar	条形图
histplot	频数直方图
xgrid	画坐标网格线
7. 多项式计算	
coeff	多项式系数
degree	多项式阶数
denom	分母项
determ	矩阵行列式值
factors	因式分解
horner	多项式计算
lcm	最小公倍数
numer	分子项
polfact	最小因式
roots	多项式的根
simp	多项式的简化
8. 字符串操作	
code2str	将 Scilab 数码转换为字符串
convstr	字母大小写转换
emptystr	清空字符串
grep	搜寻相同的字符串
part	字符提取
str2code	将字符串转换为 Scilab 数码
string	字符串转换
strcat	连接字符
strindex	字符串的字符位置搜寻
strsubst	字符串中的字符替换
9. 时间与日期	
date	日期
getdate	读日期与时间



第二章 统计

2.1


随机抽样

2.2

用样本估计总体

2.3

变量的相关性



2002年中国339个城市的空气质量状况统计图

同学们在小学和初中已经学习过统计知识，知道它的一些应用。这一章我们要进一步学习统计的有关内容。为了让大家了解统计在科学研究中的应用，我们先讲一个统计学用于二次世界大战时期军事情报的一个例子。

当时盟军情报作战机构根据间谍活动收集的情报估计出德军大约有坦克18 000辆。德军真的有这么多的坦克吗？盟军的科学家不太相信这个数字，他们从统计学知识的角度来考虑这个问题。从缴获的德军坦克知道，德军的每一辆坦克都有编号，而且这些编号是从1开始连续编排的，这样，编号就指出了制造坦克的顺序。如何从缴获坦克的编号来估计德军生产坦克的总数 N 呢？在这个问题中，我们考虑的总体是：1号坦克，2号坦克…… N 号坦克。样本是被缴获的坦克，例如，可设为5号坦克，13号坦克，95号坦克…… n 号坦克。在统计学中一个估计总数的办法是求被缴获坦克编号的平均数，并认为这个值是全部编号的中点。因此样本平均数乘以2就是总数的一个估计。用类似的统计方法估计出的结果是，1942年德军的坦克生产量约为3 400辆，后来知道这个估计与实际生产量相去不远。显然情报机构估计的数字大大超过了实际生产量。

从这个例子，我们可以看到统计学在军事科学研究中的巨大作用。统计学不光用于军事领域，还大量用于生产、生活领域。事实上，在我们日常生活中也经常要用到统计知识。例如，学期考试后，你帮助老师计算各科成绩的平均分。从平均分你能得到什么信息，平均分的信息对你有什么用处？在看电视的时候，电视节目的收视率代表什么含义？在街头，你有没有被邀请过填写一份调查表？在日常生活与学习中我们常常要知道这样那样的数据，供我们推断与决策。怎样收集和整理你需要的数据？如何从这些数据中得到有用的信息？说到这里，你大概知道我们要学习统计知识的作用和意义了吧！

统计学是用科学方法收集、整理、描述和分析所得数据资料，并由此进行推断或决策的学科。如何收集数据，根据所获得的数据提取有用的信息，作出合理的决策，这就是本章所要学习的主要内容。

2.1 随机抽样

让我们研究下面的具体问题.


问题 某校高中学生有 900 人,校医务室想对全校高中学生的身高情况作一次调查,为了不影响正常教学,准备抽取 50 名学生作为调查对象.你能帮助医务室设计一个抽取方案吗?

这个问题涉及调查对象的总体是某校全体高中学生的身高,其中每一名学生的身高是个体.问题要求从总体中抽取容量为 50 的样本来做调查.

由问题可知,要统计的变量是某校全体高中学生的身高,变量的一个取值就是某一特定学生的身高.在具体问题中,我们往往研究总体的某项数值指标,如上面某校全体高中学生的身高.因此,我们一般把所考察对象的某一数值指标的全体构成的集合看作总体,构成总体的每一个元素作为个体.从总体中抽出若干个体所组成的集合叫做样本.

在这个问题中,要得到全校高中学生的身高情况,最好的办法是对全校高中学生的身高逐一进行测量、记录.但这样做费时费力,还有可能干扰正常的教学.在更多的情况下,很难做到对所有考察的对象作全面的观测,有时根本无法施行.例如测试灯泡的寿命,了解中央电视台春节文艺晚会的收视率,判断山东省的成年人平均身高是否为全国之最等,这些试验有的是破坏性的,有的由于测试的总体包含的成员数量很大,如果逐一测试,要消耗大量的时间、人力、物力,得不偿失.一个行之有效的方法是从总体中选取部分个体(这部分个体就是总体的一个样本),并记录下来,并从这组数据来推断总体的情况.

在上述问题中,应当如何选出 50 名学生的身高作为样本呢?能否从高一年级选出 50 名学生的身高,作为样本来估计全校高中学生的身高呢?由于学生的身高会随着年龄的增长而增高,这样的抽样方案有很大的局限性.我们希望从样本的身高值去推断全体高中学生的身高状况,使样本能充分地代表总体.如何抽取样本,直接关系到对总体估计的准确程度,因此在抽样时要保证每一个个体都



测量同学的身高



测试灯泡的寿命

可能被抽到, 每一个个体被抽到的机会是均等的, 满足这样的条件的抽样是**随机抽样**. 在进行抽样时, 如何做才能满足抽样的随机性和个体被抽取机会的均等性, 统计工作者设计了许多方法. 下面介绍几种经常采用的随机抽样方法.

2.1.1

简单随机抽样

我们先来看一个例子, 一个布袋中有 6 个同样质地的小球, 从中不放回地抽取 3 个小球, 第 1 次抽取时, 6 个小球中的每一个被抽到的机会是均等的, 所以每个小球都有 $\frac{1}{6}$ 的可能性被抽到, 第 2 次抽取时, 余下的 5 个小球中的每一个都有 $\frac{1}{5}$ 的可能性被抽到, 第 3 次抽取时, 余下的 4 个小球中的每一个都有 $\frac{1}{4}$ 的可能性被抽到, 也就是说, 每次抽取时各个小球有相同的可能性被抽到.

一般地, 从元素个数为 N 的总体中不放回地抽取容量为 n 的样本, 如果每一次抽取时总体中的各个个体有相同的可能性被抽到, 这种抽样方法叫做**简单随机抽样**. 这样抽取的样本, 叫做**简单随机样本**.

常用的简单随机抽样方法有抽签法和随机数表法, 下面我们分别介绍用这两种方法如何抽出简单随机样本.

1. 抽签法

从一个 100 支日光灯管寿命的总体中, 用不放回的方法抽取 10 支日光灯管寿命构成一个简单随机样本. 我们可以给这 100 支日光灯管寿命编号, 每一支日光灯管寿命对应 1 到 100 中的唯一一个数, 再把这 100 个号分别写在相同的 100 张纸片 (或小球、竹块) 上, 然后把它们放在一个容器里搅拌均匀, 就可以抽样了. 抽出一张纸片, 记下上面的号码, 然后再搅拌均匀, 继续抽取第 2 张纸片, 记下号码. 重复这个过程直到取得 10 个号码时终止. 于是, 和这 10 个号码对应的日光灯管寿命就构成了一个简单随机样本.

抽签法的优点是简单易行. 缺点是, 当总体的容量非常大时, 费时、费力又不方便. 况且, 如果标号的纸片或小球搅拌得不均匀, 可能导致抽样的不公平.

2. 随机数表法

随机数表是由 0, 1, 2, ..., 9 这 10 个数字组成的数表, 并且表中的每一位置出现各个数字的可能性相同. 通过随机数生成器, 例如使用计算器或计算机的应用程序生成随机数的功能, 可以生成一张随机数表 (表 2-1), 通常根据实际需要和方便使用的原则, 将几个数组合成一组, 如 5 个数一组, 然后通过随机数表抽取样本.

要考察某种品牌的 850 颗种子的发芽率, 从中抽取 50 颗种子进行实验, 用随机数表抽取的步骤如下:

(1) 对 850 颗种子进行编号, 可编为 001, 002, \dots , 850.

(2) 给出的随机数表中是 5 个数一组, 使用各个 5 位数组的前 3 位, 从各组数中任选一个前 3 位小于或等于 850 的数作为起始号码. 例如从第 1 行第 7 组数开始, 取出 530 作为抽取的 50 颗种子中的第 1 个的代号.

(3) 继续向右读, 由于 987 大于 850, 跳过这组数不取, 继续向右读, 得到 415 作为第 2 个的代号. 数组的前 3 位数不大于 850 且不与前面取出的数重复, 就把它取出, 否则就跳过不取, 取到一行末尾时转到下一行从左到右继续读数. 如此下去直到得出在 001~850 之间的 50 个三位数.

上面我们是从左到右读数, 也可以用从上到下读数或其他有规则的读数方法.

目前, 计算器和许多计算机数学软件都能很方便地生成随机数序列, 大家可使用它们抽取随机样本.

表 2-1 随机数表

48628	50089	38155	69882	27761	73903	53014	98720	41571	79413
53666	08912	48395	32616	34905	63640	57931	72328	49195	17699
00620	79613	29901	92364	38659	64526	20236	29793	09063	99398
98246	18957	91965	13529	97168	97299	68402	68378	89201	67871
01114	19048	00895	91770	95934	31491	72529	39980	45750	14155
41410	51595	89983	82330	96809	93877	92818	84275	45938	48490
30009	18573	58934	35285	14684	35260	44253	64517	66128	14585
64687	84771	97114	93908	65570	33972	15539	31126	56349	82215
78379	70304	75649	86829	28720	57275	10695	25678	60880	15603
31238	95419	34708	07892	34373	25823	60086	33523	39773	75483



探索与研究

使用科学计算器或 Scilab 软件的随机数生成功能生成 3 位数字一组的随机数表, 并用你生成的随机数表给出本节开头问题的一个简单随机抽样方案.



练习 A

1. 什么是简单随机抽样?
2. 在一般“调查”时, 为什么要进行抽样调查?
3. 如果想了解你所在班上同学喜欢听数学课的比例, 计划抽取 8 名同学做调查. 请你用抽签法抽取一个样本.



练习B

1. 某居民区有 730 户居民, 居委会计划从中抽取 25 户调查其家庭收入状况, 你能帮助居委会抽出一个简单随机样本吗?
2. 使用计算器或计算机制作一张 1 000 个一位数的随机数表, 并检查 0~9 这 10 个数在表中出现的可能性是否相同?

2.1.2

系统抽样

实际抽样中往往要考察容量很大的总体, 例如某省农村家庭的年平均收入状况, 某电视机厂生产的某种型号的电视机的质量是否合格. 这时样本容量越大越能更好地反映总体特征, 但工作量也随之增大. 当总体元素个数很大时, 样本容量就不宜太小, 采用简单随机抽样, 就显得费事. 这时, 可将总体分成均衡的若干部分, 然后按照预先制定的规则, 从每一部分抽取一个个体, 得到所需要的样本, 这种抽样的方法叫做**系统抽样**.

为了了解某地区今年高一学生期末考试数学科的成绩, 拟从参加考试的 15 000 名学生的数学成绩中抽取容量为 150 的样本. 对全体学生的数学成绩进行编号, 号码为从 1~15 000. 样本容量与总体容量的比为 $150 : 15\,000 = 1 : 100$, 我们可将总体平均分为 150 个部分, 其中每一部分包含 100 个号码, 然后对 1~100 号进行简单随机抽样, 抽取一个号码, 比如说是 56, 接下来每隔 100 个号码抽取一个, 顺次取出号码为 156, 256, ..., 14 956 的学生. 这样就可得到容量为 150 的一个样本.

从元素个数为 N 的总体中抽取容量为 n 的样本, 如果总体容量能被样本容量整除, 设 $k = \frac{N}{n}$, 可先由数字 1 到 k 中随机地抽取一个数 s 作为起始数, 然后顺次抽取第 $s+k$, $s+2k$, ..., $s+(n-1)k$ 个数, 这样就得到容量为 n 的样本. 如果总体容量不能被样本容量整除, 可随机地从总体中剔除余数, 然后再按系统抽样方法进行抽样.

在进行大规模的抽样调查时, 系统抽样比简单随机抽样要方便很多, 因而应用的范围很广. 由于抽样的间隔相等, 因此系统抽样也被称作**等距抽样**.



练习A

1. 什么是系统抽样? 系统抽样有什么优点?
2. 从编号为 1~900 的总体中用系统抽样的办法抽取一个容量为 9 的样本.



练习B

1. 某批产品共有 1 563 件, 产品按出厂顺序编号, 号码为从 1~1 563. 检测员要从中抽取 15 件产品作检测, 请你给出一个系统抽样方案.
2. 要考察某商场 2003 年的日销售额, 从一年时间中抽取 52 天的销售额作为样本, 请给出你的系统抽样方案, 并说说你的抽样方案的优点和不足.

2.1.3

分层抽样

当总体由有明显差别的几部分组成时, 为了使抽取的样本更好地反映总体的情况, 常采用分层抽样. 将总体中各个个体按某种特征分成若干个互不重叠的几部分, 每一部分叫做层, 在各层中按层在总体中所占比例进行简单随机抽样或系统抽样, 这种抽样方法叫做**分层抽样**.

例如, 某中学高中学生有 900 名. 为了考察他们的体重状况, 打算抽取容量为 45 的一个样本. 已知高一有 400 名学生, 高二有 300 名学生, 高三有 200 名学生. 采用分层抽样, 样本容量与总体容量的比为 $45:900=1:20$, 所以在高一、高二、高三 3 个层面上取的学生数分别为 $\frac{400}{20}$, $\frac{300}{20}$, $\frac{200}{20}$, 即分别抽取 20, 15, 10 名学生. 当有些层面上抽取的学生数用除法算出的结果不是整数时, 可作适当的细微调整, 使抽取的学生数为整数. 假如上例中高一、高二、高三的学生数分别为 402, 296, 202, 则这三个层面上取的学生数用除法计算分别为 $\frac{402}{20}=20.1$; $\frac{296}{20}=14.8$; $\frac{202}{20}=10.1$, 每层还是分别按 20, 15, 10 名学生抽取. 在 3 个层面上抽样时, 可以采用简单随机抽样方法.

分层抽样的优点是, 使样本具有较强的代表性, 而且在各层抽样时, 又可灵活地选用不同的抽样法. 因此, 分层抽样应用比较广泛.



练习A

1. 某校高一学生共 500 名, 经调查, 喜欢数学的学生占全体学生的 30%, 不喜欢数学的人数占 40%, 介于两者之间的学生占 30%. 为了考查学生的期中考试的数学成绩, 如何用分层抽样抽取一个容量为 50 的样本.
2. 某公司有员工 500 人, 其中不到 35 岁的有 125 人, 35~49 岁的有 280 人, 50 岁以上的有 95 人. 为了调查员工的身体健康状况, 从中抽取 100 名员工, 用分层抽样应当怎样抽取?

3. 某大学就餐中心为了了解新生的饮食习惯,以分层抽样的方式从1500名新生中抽取200名进行调查,新生中的南方学生有500名,北方学生有800名,西部地区的学生有200名,应如何抽取?



练习B

某市电视台在因特网上征集电视节目的现场参与观众,报名的共有12000人,分别来自4个城区,其中东城区2400人,西城区4605人,南城区3795人,北城区1200人.用分层抽样的方式从中抽取60人参加现场节目,应当如何抽取?

2.1.4

数据的收集

在实际统计调查时,一般先要确定调查的目的、对象,也就是统计调查要解决的问题和需要调查的总体;还要确定好调查的项目,也就是要统计的变量.接下来就可以开始收集数据了.收集数据通常有下面一些方式.

1. 做试验

根据调查项目的要求来设计一些合适的试验,能够直接地获得样本数据.例如要统计一颗骰子各个点数出现的频率,就可做抛掷骰子的试验,记下每次抛掷骰子出现的点数,得到样本数据.试验时要注意准备好试验的用具(或组织好观测的对象)、指定专门的记录人员等.做试验通常能得到可靠的数据资料,但需花费的人力、物力、时间较多.

2. 查阅资料

有些数据资料不容易直接调查得到,这时可以通过查阅统计年鉴、图书馆文献等办法获得所需或相关的数据,比如全国历次人口普查的数据都可以在统计年鉴中查阅到.还可以通过因特网上的资源得到数据资料.

3. 设计调查问卷

做实际调查时往往要设计调查问卷.调查问卷一般由一组有目的、有系统、有顺序的题目组成.问题由调查人员根据调查的目的、项目进行设计.设计题目时要注意符合下面的要求:

- (1) 问题要具体,有针对性,使受调查者能够容易作答.



在因特网上查找需要的数据

问卷中要避免一般性或不具体的问题。例如，调查消费者对某型号电视机满意程度应包含外观、功能、价格三个方面，如果问题设计成为：

您对某型号电视机是否满意？

1. 满意
2. 一般
3. 不满意

则可能有消费者对外观满意而对功能不满意而不知怎样去选择。应将问题细化为三个方面：

	满意	一般	不满意
您对某型号电视机的外观是否满意？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
您对某型号电视机的功能是否满意？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
您对某型号电视机的价格是否满意？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

这样才能了解消费者的真正想法，达到调查的目的。

(2) 语言简单、准确，含义清楚，避免出现有歧义或意思含混的句子。

所问内容的定义要明确，便于受调查者能够准确地回答。例如了解家庭情况时提问“您家里有几个孩子”。对于“孩子”的界定，不同年龄的受调查者可能会有不同的理解，提问时就应明确孩子的定义。

(3) 题目不能出现引导受调查者答题倾向的语句。

不应出现对答题选项有倾向性的话语。例如调查问题是“大家都认为国家足球队肯

定能小组出线，您的意见为_____。”这种问法可能导致答卷者选择小组出线的答案。

调查问卷可以通过邮寄、打电话、派专人调查、网络调查等方式得到答卷。

实际调查时会遇到很多具体问题，收集数据的方式也要灵活使用。通过这几种方式收集的数据，还要经过汇总，最后写成调查分析报告。



练习 A

1. 想一想怎样可以得到你所在班级同学的身高数据。
2. 你还能想到哪些可以得到数据资料的途径？



练习 B

为了了解中学生如何度过课余时间，请你设计一份关于中学生课余活动的调查问卷，实际调查后写出调查分析报告。

习题 2-1 A

1. 为了考察某地 10 000 名高一学生的体重情况，从中抽出了 200 名学生做调查。这里的总体、个体、样本、样本容量各指什么？为什么我们一般要从总体中抽取一个样本，通过样本来研究总体？
2. 要从编号为 1~100 的 100 道选择题中随机抽取 20 道题组成一份考卷，请你用抽签法给出考题的编号。
3. 某商店有 590 件货物，要从中选出 50 件货物做质量检查，请你用随机数表法给出一个抽样方案。
4. 北京故宫博物院某天接待游客 10 000 人（假设把他们编号为 0~9 999），如果要从这些游客中随机选出 10 名幸运游客，请你用系统抽样的方式给出幸运游客的编号。
5. 一支田径队中有男运动员 56 人，女运动员 42 人，用分层抽样的方式从全队中抽取 28 名运动员。
6. 某市有 210 家百货商店，其中大型商店有 20 家，中型商店有 40 家，小型商店有 150 家。为了了解商店的销售情况，要从中抽取 21 家商店进行调查，请你用分层抽样的方式进行抽取。

习题 2-1 B

1. 某公园为了考察每天游览的人数, 从一年中要抽取 30 天进行统计, 请你分别用随机数表法、系统抽样法、分层抽样法给出样本, 并根据样本比较这 3 种抽样方式.
2. 随着互联网络的发展与普及, 网络调查方式的使用越来越多. 你能比较一下传统的调查方式与网络调查方式的优劣吗?

2.2 用样本估计总体

用随机抽样的方法在总体中抽取样本,我们就得到一组数据.在初中学过的统计知识基础上,还可以画出这些数据的频率分布直方图,可以算出这些数据的平均数和标准差.这些信息和原来的总体有什么关系呢?理论研究表明,我们可以用样本的频率分布估计总体的分布,可以用样本的数字特征(如平均数、标准差)估计总体的数字特征.

2.2.1

用样本的频率分布估计总体的分布

从一个总体得到一个包含大量数据的样本时,我们很难从一个个数字中直接看出样本所包含的信息.如果把这些数据形成频数分布或频率分布,就可以比较清楚地看出样本数据的特征,从而估计总体的分布情况.

看下面的例子.

某钢铁加工厂生产内径为 25.40 mm 的钢管,为了掌握产品的生产状况,需要定期对产品进行检测.又由于产品的数量巨大,不可能一一检测所有的钢管,因而通常采用随机抽样的办法.如果把这些钢管的内径看成总体,我们可以从中随机抽取 100 件钢管进行检测,把这 100 件钢管的质量分布情况作为总体的质量分布情况来看待.根据规定,钢管内径的尺寸在区间 25.325~25.475 内为优等品,我们特别希望知道所有生产的钢管中优等品所占的比例,这时就可以用样本的分布情况估计总体的分布情况.

下面的数据是一次抽样中的 100 件钢管的内径尺寸(单位: mm):

25.39 25.36 25.34 25.42 25.45 25.38 25.39 25.42 25.47 25.35
25.41 25.43 25.44 25.48 25.45 25.43 25.46 25.40 25.51 25.45
25.40 25.39 25.41 25.36 25.38 25.31 25.56 25.43 25.40 25.38
25.37 25.44 25.33 25.46 25.40 25.49 25.34 25.42 25.50 25.37
25.35 25.32 25.45 25.40 25.27 25.43 25.54 25.39 25.45 25.43
25.40 25.43 25.44 25.41 25.53 25.37 25.38 25.24 25.44 25.40
25.36 25.42 25.39 25.46 25.38 25.35 25.31 25.34 25.40 25.36
25.41 25.32 25.38 25.42 25.40 25.33 25.37 25.41 25.49 25.35
25.47 25.34 25.30 25.39 25.36 25.46 25.29 25.40 25.37 25.33
25.40 25.35 25.41 25.37 25.47 25.39 25.42 25.47 25.38 25.39

上面的 100 个数据有点散乱, 从中很难看出产品质量的分布情况, 必须对样本数据用统计的方法加以概括和整理. 我们在初中已经学习过把样本数据表示成频数分布表和频数分布直方图这样的表、图形式. 从表、图中可以直观地看出样本数据的分布情况. 下面我们进一步列出这组样本数据的频率分布表、频率分布直方图, 步骤如下:

(1) 计算极差

极差是一组数据的最大值与最小值的差, 它反映了一组数据变化的幅度, 极差又叫全距. 因此计算极差时, 需要找出这组数据的最大值和最小值. 当数据很多时, 怎样求出一组数据的最大值呢?

找出这组数据最大值的算法:

S1 把这 100 个数据命名为 $A(1), A(2), A(3), \dots, A(100)$;

S2 设变量 $x=A(1)$;

S3 把 $A(i) (i=2, \dots, 100)$ 逐个与 x 比较, 如果 $A(i) > x$, 则 $x=A(i)$.

想一想, 怎样求出这组数据的最小值?

运用上面的算法得出这组样本数据的最大值是 25.56, 用类似的算法可以得出最小值是 25.24, 它们的差 $=25.56-25.24=0.32$, 所以极差等于 0.32.

(2) 决定组数与组距

样本数据有 100 个, 可以把它们分为 8~12 组, 我们这里取 11 组. 上面算得极差为 0.32, 因此组距为

$$\frac{\text{极差}}{\text{组数}} = \frac{0.32}{11} \approx 0.03.$$

(3) 决定分点

将第一组的起点定为 25.235, 组距为 0.03, 这样所分的 11 个组是:

第 1 组: 25.235~25.265

第 2 组: 25.265~25.295

第 3 组: 25.295~25.325

第 4 组: 25.325~25.355

第 5 组: 25.355~25.385

第 6 组: 25.385~25.415

第 7 组: 25.415~25.445

第 8 组: 25.445~25.475

第 9 组: 25.475~25.505

第 10 组: 25.505~25.535

第 11 组: 25.535~25.565

(4) 列频率分布表

通过下面的算法, 对落在各个小组内数据的个数进行累计, 这个累计数叫做各个小组的频数, 各小组的频数除以样本容量, 得各小组的频率.

求各个小组频数的算法:

S1 设 $B(j)$ 为落在第 j 个小组内的数据个数, 且 $B(j)=0 (j=1, 2, \dots, 11)$;

S2 逐一判断 $A(i) (i=1, 2, \dots, 100)$ 落入哪一个小组, 若落入第 j 个小组, 则 $B(j)=B(j)+1$.

表 2-2 频率分布表

分组	个数累计	频数	频率
25.235~25.265	—	1	0.01
25.265~25.295	丁	2	0.02
25.295~25.325	正	5	0.05
25.325~25.355	正正丁	12	0.12
25.355~25.385	正正正下	18	0.18
25.385~25.415	正正正正正	25	0.25
25.415~25.445	正正正一	16	0.16
25.445~25.475	正正下	13	0.13
25.475~25.505	正	4	0.04
25.505~25.535	丁	2	0.02
25.535~25.565	丁	2	0.02
合计	100	100	1.00

(5) 绘制频率分布直方图

在直角坐标系中，用横轴表示产品内径尺寸，纵轴表示频率与组距的比值，得到频率分布直方图(图 2-1).




图 2-1

容易看出

$$\text{小长方形面积} = \text{组距} \times \frac{\text{频率}}{\text{组距}} = \text{频率}$$

这就是说，各个小长方形的面积等于相应各组的频率，显然，所有小长方形面积之和等

于 1.

为了了解全部产品中优等品所占比例,可以统计出内径尺寸在区间 $25.325 \sim 25.475$ 内的个体数在样本容量中所占的比例,也就是它的频率.从表 2-2 或图 2-1 容易看出,这个频率值等于 $0.12+0.18+0.25+0.16+0.13=0.84$.于是可以估计出所有生产的钢管中有 84% 的优等品.工厂可以根据质量规范,看看是否达到优等品率的要求,如果没有达到,就需要进一步分析原因,解决问题.

当然,用样本的频率分布估计总体的分布时,要使样本能够很好地反映总体的特性,必须随机抽取样本.由于抽样的随机性,可以想到(参考本节练习 A 第 3 题),如果随机抽取另外一个容量为 100 的样本,所形成的样本频率分布一般会与前一个样本频率分布有所不同.但是,它们都可以近似地看作总体的分布.

从频率分布直方图可以清楚地看出数据分布的总体态势,但是从直方图本身得不出原始的数据内容.所以,把数据表示成直方图后,原有的具体数据信息就被抹掉了.

把频率分布直方图各个小长方形上边的中点用线段连接起来,就得到频率分布折线图(图 2-2).为了方便看图,一般习惯于把频率分布折线图画成与横轴相连,所以横轴上的左右两 endpoints 没有实际的意义.




图 2-2

图 2-1 中各个小长方形的面积,表明了所抽取的 100 件产品内径尺寸落在各个小组内的产品个数与 100 的比值的大小.如果样本容量越大,所分组数越多,图中表示的频率分布就越接近于总体在各个小组内所取值的个数与总数比值的大小.设想如果样本容量不断增大,分组的组距不断缩小,则频率分布直方图实际上越来越接近于总体的分布,它可以用一条光滑曲线 $y=f(x)$ 来描绘,这条光滑曲线就叫做**总体密度曲线**.总体密度曲线精确地反映了一个总体在各个区域内取值的规律.产品尺寸落在 (a, b) 内的百分率就是图中带斜线部分的面积(图 2-3).对本例来说,总体密度曲线呈中间高两边低的“钟”形分布,总体的数据大致呈对称分布,并且大部分数据都集中在靠近中间的区间内.

抽样后的样本数据汇总,还可以借助计算机来准确、迅速地作出.图 2-4 就是运用前面所讲的画直方图的步骤,在工作表中对样本数据汇总得出的结果.




图 2-3




图 2-4

常用的统计图表还有茎叶图，下面我们通过一个例子来学习用茎叶图表示数据。

例 某赛季甲、乙两名篮球运动员每场比赛的得分情况如下：

甲的得分：12, 15, 24, 25, 31, 31, 36, 36, 37, 39, 44, 49, 50.

乙的得分：8, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 33, 38, 39, 51.

上面的数据可以用图 2-5 来表示，它的中间部分像一棵植物的茎，两边部分像这棵植物茎上生长出来的叶子，用中间的数字表示两位运动员得分的十位数，两边的数字分别表示两个人各场比赛得分的个位数。例如，用 3 | 389 就表示了 33, 38, 39 这 3 个数据，通常把这样的图叫做**茎叶图**。根据图 2-5 可以对两名运动员的成绩进行比较。

工作表是 OpenOffice 软件的一个组件，它是一种开放源码并可以免费自由使用的软件。




图 2-5

从上面这个茎叶图上可以看出, 甲运动员的得分情况是大致对称的, 中位数是 36; 乙运动员的得分情况除一个特殊得分外, 也大致对称, 中位数是 26.

用茎叶图表示数据有两个突出的优点, 一是从统计图上没有原始信息的损失, 所有的数据信息都可以从茎叶图中得到; 二是茎叶图可以在比赛时随时记录, 方便记录与表示.



练习 A

1. 从一批灯泡中抽取 50 只灯泡作使用寿命的测试, 所得数据如下 (单位: h):

886	928	999	946	950	864	1 050	927	949	852
1 027	928	978	816	1 000	918	1 040	854	1 100	900
866	905	954	890	1 006	926	900	999	886	1 120
893	900	800	938	864	919	863	981	916	818
946	926	895	967	921	978	821	924	651	850

根据上面的数据列出频率分布表, 画出频率分布直方图、频率分布折线图, 并估计寿命在 1 000~1 150 h 的灯泡在这批灯泡中所占的百分比.

2. 从某中学高三年级随机抽取 80 名男生的身高如下 (单位: cm):

168	184	175	182	168	190	170	188	176	193
173	179	170	173	171	193	171	159	186	175
161	165	175	187	174	162	173	178	163	172
166	178	182	175	194	177	169	174	168	170
180	178	189	161	175	173	160	179	183	171
179	162	167	166	178	185	176	165	171	175
165	180	173	157	188	178	162	176	153	174
175	167	173	181	172	163	176	175	168	177

根据上面的数据列出频率分布表,画出频率分布直方图、频率分布折线图,并估计这所学校高三年级男生身高在 165~175 cm 之间的比例.

3. 下面是某钢铁加工厂所生产钢管内径尺寸(单位: mm)的另一个容量为 100 的随机抽样样本.

25.39 25.41 25.40 25.37 25.35 25.40 25.36 25.41 25.47 25.40
 25.38 25.45 25.41 25.46 25.34 25.45 25.44 25.34 25.36 25.37
 25.34 25.44 25.41 25.33 25.45 25.44 25.39 25.38 25.30 25.41
 25.44 25.50 25.38 25.48 25.42 25.43 25.48 25.44 25.41 25.39
 25.39 25.41 25.40 25.37 25.35 25.40 25.36 25.41 25.47 25.40
 25.40 25.45 25.33 25.51 25.45 25.39 25.37 25.35 25.48 25.41
 25.39 25.46 25.56 25.34 25.54 25.38 25.31 25.37 25.29 25.42
 25.44 25.42 25.45 25.44 25.41 25.26 25.36 25.43 25.42 25.49
 25.47 25.51 25.40 25.50 25.45 25.44 25.40 25.49 25.37 25.38
 25.37 25.47 25.40 25.39 25.45 25.42 25.38 25.37 25.35 25.41

根据样本数据列出频率分布表、画出频率分布直方图,并与书中的频率分布直方图比较,你能得到什么结论?

4. 某市对上、下班交通情况做抽样调查,上、下班时间各抽取了 12 辆机动车,行驶时速如下(单位: km/h):

上班时: 30 33 18 27 32 40 26 28 21 28 35 20

下班时: 27 19 32 29 36 29 30 22 25 16 17 30

用茎叶图表示上面的样本数据,并求出样本数据的中位数.



练习B

1. 从一批洗衣粉中随机抽查 50 袋洗衣粉,测得的质量数据如下(单位: g):

494 498 493 505 496 492 490 490 500 499

494 495 483 485 502 493 505 485 501 491

493 500 509 512 484 509 510 495 497 498

504 498 483 510 503 497 502 498 497 500

493 499 505 493 491 497 515 503 498 518

列出频率分布表并画出频率分布直方图,这个频率分布能不能代表这批洗衣粉质量的分布情况呢?

2. 从总体中抽取容量为 100 的样本,数据分组及各组的频数如下:

分组	频数
[22.7, 25.7)	6
[25.7, 28.7)	16
[28.7, 31.7)	18
[31.7, 34.7)	22
[34.7, 37.7)	20
[37.7, 40.7)	10
[40.7, 43.7)	8

- (1) 列出样本的频率分布表;
- (2) 画出频率分布直方图;
- (3) 根据频率分布直方图, 估计小于 35 的数据所占总体的百分比.

3. 甲、乙两个小组各 10 名学生的英语口语测试成绩如下 (单位: 分):

甲组 76 90 84 86 81 87 86 82 85 83

乙组 82 84 85 89 79 80 91 89 79 74

试用茎叶图表示两个小组的成绩.

2.2.2

用样本的数字特征估计总体的数字特征

在日常生活的很多情况下, 我们往往并不需要了解总体的分布形态, 而是更关心总体的某一数字特征. 比如购买灯泡时, 消费者希望知道的是这批灯泡的平均使用寿命. 我们怎样来了解这批灯泡的平均使用寿命呢? 当然不可能把所有灯泡逐一测试, 因为测试后灯泡就报废了. 于是, 需要通过随机抽样, 把这批灯泡的寿命看作总体, 从中随机取出若干个个体作为样本, 算出样本的数字特征, 用样本的数字特征 (如平均数等) 来估计总体的数字特征.

1. 用样本平均数估计总体平均数

我们在初中学过, 平均数描述了数据的平均水平, 定量地反映了数据的集中趋势所处的水平. 那么, 怎样用样本的平均数估计总体的平均数呢?

例 1 从某大型企业全体员工某月的月工资表中随机抽取 50 名员工的月工资资料如下 (单位: 元):

800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000
 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200
 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500
 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000
 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500

试计算这 50 名员工的月工资平均数, 并估计这个企业员工的月平均工资.

解: 月平均工资 = $\frac{800+800+\cdots+2\,500}{50} = 1\,320$ (元). 由此可以估计这家大型企业员工的月平均工资为 1 320 元.

假设你去这家企业应聘职位, 月平均工资水平应是你要考虑的重要因素. 一般来讲, 月平均工资水平可以用来与同类企业的工资待遇作比较.

同样, 再随机抽取 50 名员工的工资, 计算所得的样本平均数一般会与例 1 中的样本平均数不同. 所以, 用样本的平均数估计总体的平均数时, 样本的平均数只是总体的平均数的近似.

我们知道, n 个样本数据 x_1, x_2, \dots, x_n 的平均数 $\bar{x} = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$, 则有 $n\bar{x} = x_1+x_2+\cdots+x_n$. 也就是把每个 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 都用 \bar{x} 代替后, 数据总和保持不变. 所以平均数 \bar{x} 对数据有“取齐”的作用, 代表了一组数据的数值平均水平.

在例 1 中, 可能有人会猜测, 应有 50% 的员工工资超过平均数, 而 50% 低于平均数. 我们用前面学习的方法画出例 1 中月工资的频率分布直方图 (图 2-6), 并标出样本平




图 2-6

均数. 由数据可以得出, 只有 30% 的员工工资超过平均数, 其余 70% 在平均数以下. 想一想什么原因导致了这个结果.

2. 用样本标准差估计总体标准差

数据的离散程度可以用极差、方差或标准差来描述. 我们知道, 样本方差描述了一组数据围绕平均数波动的大小. 为了得到以样本数据的单位表示的波动幅度, 通常要求出样本方差的算术平方根. 一般地, 设样本的元素为 x_1, x_2, \dots, x_n , 样本的平均数为 \bar{x} , 定义

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n},$$

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}.$$

其中 s^2 表示 **样本方差**, s 表示 **样本标准差**.

计算样本数据 x_1, x_2, \dots, x_n 的标准差的算法是:

S1 算出样本数据的平均数 \bar{x} ;

S2 算出每个样本数据与样本平均数的差

$$x_i - \bar{x} \quad (i=1, 2, \dots, n);$$

S3 算出 S2 中 $x_i - \bar{x} \quad (i=1, 2, \dots, n)$ 的平方;

S4 算出 S3 中 n 个平方数的平均数, 即为样本方差;

S5 算出 S4 中平均数的算术平方根, 即为样本标准差.

例 2 计算数据 5, 7, 7, 8, 10, 11 的标准差.

解: S1 $\bar{x} = \frac{5+7+7+8+10+11}{6} = 8;$

数据 x_i	S1 \bar{x}	S2 $x_i - \bar{x}$	S3 $(x_i - \bar{x})^2$
5	8	-3	9
7	8	-1	1
7	8	-1	1
8	8	0	0
10	8	2	4
11	8	3	9

S4 $s^2 = \frac{9+1+1+0+4+9}{6} = 4;$

S5 $s = \sqrt{4} = 2.$

所以这组数据的标准差为 2.

例 3 从某灯泡厂生产的一批灯泡中随机地抽取 10 只进行寿命测试, 得数据如下 (单位: h):

1 458 1 395 1 562 1 614 1 351
1 490 1 478 1 382 1 536 1 496

使用函数型计算器求样本平均数 \bar{x} 和样本标准差 s .

解: 按键

MODE 2 (进入统计计算状态)

SHIFT **CLR** 1 **=** (将计算器存储器设置成初始状态)

1458 **DT** 1395 **DT** 1562 **DT** 1614 **DT** 1351 **DT**
1490 **DT** 1478 **DT** 1382 **DT** 1536 **DT** 1496 **DT** (键入数据)

继续按下表按键

按键	显示结果
SHIFT S-VAR 1 =	1476.2
SHIFT S-VAR 2 =	78.7309342

即样本平均数 $\bar{x}=1476.2$, 样本标准差 $s=78.7309342$.

这里, 我们更关心的是这批灯泡寿命的情况. 我们可以用算出的样本标准差 $s=78.7309342$ 来估计这批灯泡寿命的变化幅度的大小, 也就是说用样本的标准差可以估计总体的标准差. 如果再抽取 10 只, 算得的标准差一般会与例 3 的标准差不同. 这就表明样本标准差具有随机性.



探索与研究

当数据很多时, 用工作表软件和 Scilab 软件可以更方便、快捷地求出一组数据的标准差, 你可以尝试使用这些软件来计算样本的数字特征.

例 4 借助计算工具求 2.2.1 节从一批产品中抽取的 100 件钢管内径尺寸的样本标准差, 并估计这批产品内径尺寸的标准差.

解: 求出样本数据的平均数 $\bar{x}=25.401$; 样本标准差 $s=0.056$.

用样本标准差可以估计出这批产品内径尺寸的总体标准差为 0.056, 也就是产品内径尺寸对于平均数的平均波动幅度是 0.056 左右.

平均数和标准差是工业生产中监测产品质量的重要指标, 当样本的平均数或标准差超过了规定界限的时候, 说明这批产品的质量可能距生产要求有较大的偏离, 应该进行检查, 找出原因, 从而及时解决问题.

例 5 从甲、乙两名学生中选拔一人参加射击比赛, 对他们的射击水平进行了测试, 两人在相同条件下各射击 10 次, 命中的环数如下:

甲 7 8 6 8 6 5 9 10 7 4

乙 9 5 7 8 7 6 8 6 7 7

(1) 计算甲、乙两人射击命中环数的平均数和标准差;

(2) 比较两人的成绩, 然后决定选择哪一人参赛.



解: (1) 计算得 $\bar{x}_甲=7$, $\bar{x}_乙=7$; $s_甲=1.73$, $s_乙=1.10$.

(2) 由(1)可知, 甲、乙两人的平均成绩相等, 但 $s_乙 < s_甲$, 这表明乙的成绩比甲的成绩稳定一些, 从成绩的稳定性考虑, 可以选择乙参赛.

样本标准差和频率分布直方图有什么关系呢? 从标准差的定义可知, 如果样本各数据

值都相等, 则标准差得 0, 表明数据没有波动幅度, 数据没有离散性; 若个体的值与平均数的差的绝对值较大, 则标准差也较大, 表明数据的波动幅度也很大, 数据离散程度很高. 因此标准差描述了数据对平均数的离散程度 (表 2-3).

表 2-3

	A	B
样本数据	3 3 3 3 3	1 1 3 5 5
样本平均数	3	3
样本标准差	0	1.79
频率分布直方图	 <p style="text-align: center;">数据没有离散性</p>	 <p style="text-align: center;">数据离散程度很高</p>

再来看钢管内径尺寸的例子, 它的样本平均数为 25.401, 样本标准差为 0.056. 在直方图中用虚线标出平均数所在的位置, 并画出距平均数两侧各一倍标准差和两倍标准差的区间. 可以看到有大约 70% 的钢管内径尺寸落在距平均数两侧各一倍标准差的区间内, 即区间 $(\bar{x}-s, \bar{x}+s)$, 大约有 95% 的钢管内径尺寸落在距平均数两侧各两倍标准差的区间内, 即区间 $(\bar{x}-2s, \bar{x}+2s)$. 由此我们估计总体中也有大致比率的产品尺寸落入到相应的区间内. 实际生产、生活中有大量的例子符合这样的统计规律, 比如同一年龄段的人群的身高、体重, 同一生产线生产的袋装洗衣粉的质量等.




图 2-7



练习 A

1. 用自动包装机包糖, 现从包装好的一批糖中任取 9 包, 称得净质量数据如下 (单位: kg):

99.2 98.6 100.3 101.3 98.3 99.8 99.4 101.9 100.5

求出这 9 包糖的平均质量和质量的标准差, 并估计包装好的这批糖的平均质量和标准差.

2. 随机抽取某种节日彩灯 5 只, 测得使用寿命如下 (单位: h):

1 502 1 453 1 067 1 156 1 196

计算这 5 只节日彩灯的平均使用寿命及使用寿命的标准差, 并估计这种节日彩灯的平均使用寿命及使用寿命的标准差.

3. 计算 2.2.1 节练习 A 第 3 题中样本数据的平均数和标准差, 并与本节例 4 的结果相比较, 你有什么体会.



练习 B

1. 某工厂生产滚珠, 从某批产品中随机抽取 8 粒, 量得直径分别为 (单位: mm):

14.8 14.6 15.1 15.0 14.9 15.1 15.0 14.9

试估计该厂生产的滚珠直径的平均数和标准差.

2. 从 1 000 个零件中抽取 10 件, 每件长度如下 (单位: mm):

22.36 22.35 22.33 22.35 22.37 22.34 22.38 22.36 22.32
22.35

使用函数型计算器计算样本的平均数和标准差, 并估计总体的平均数和标准差.

习题 2-2 A

1. 为了解中学生的身体发育情况, 对某一中学同年龄的 50 名男生的身高进行了测量, 结果如下 (单位: cm):

175 168 170 176 167 181 162 173 171 177
179 172 165 157 172 173 166 177 169 181

160 163 166 177 175 174 173 174 171 171
 158 170 165 175 165 174 169 163 166 166
 174 172 166 172 167 172 175 161 173 167

- (1) 列出样本的频率分布表，画出频率分布直方图；
- (2) 计算样本的平均数和标准差；
- (3) 由样本数据估计总体中有多少数据落入区间 $(\bar{x}-s, \bar{x}+s)$.

2. 在一批棉花中抽测了 60 根棉花的纤维长度，结果如下（单位：mm）：

82 202 352 321 25 293 293 86 28 206
 323 355 357 33 325 113 233 294 50 296
 115 236 357 326 52 301 140 328 238 358
 58 255 143 360 340 302 370 343 260 303
 59 146 60 263 170 305 380 346 61 305
 175 348 264 383 62 306 195 350 265 385

- (1) 列出样本的频率分布表，画出频率分布直方图；
- (2) 计算样本的平均数和标准差；
- (3) 由样本数据估计总体中有多少数据落入区间 $(\bar{x}-2s, \bar{x}+2s)$.

3. 在同等条件下，对 30 辆同一型号的汽车进行耗油 1 L 所行路程的试验，得到如下数据（单位：km）：

14.1 12.3 13.7 14.0 12.8 12.9 13.1 13.6 14.4 13.8
 12.6 13.8 12.6 13.2 13.3 14.2 13.9 12.7 13.0 13.2
 13.5 13.6 13.4 13.6 12.1 12.5 13.1 13.5 13.2 13.4

以前两位数为茎画出上面数据的茎叶图（只有单侧有数据），并找出中位数。

4. 在一次中学生田径运动会上，参加男子跳高的 17 名运动员的成绩如下表所示（单位：m）：

成绩	1.50	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90
人数	2	3	2	3	4	1	1	1

计算这些运动员成绩的平均数（计算结果保留到小数点后两位）。

5. 两名跳远运动员在 10 次测试中的成绩分别如下（单位：m）：

甲：5.85 5.93 6.07 5.91 5.99 6.13 5.89 6.05 6.00 6.19

乙：6.11 6.08 5.83 5.92 5.84 5.81 6.18 6.17 5.85 6.21

分别计算两个样本标准差，并根据计算结果估计哪位运动员的成绩比较稳定。

6. 计算下列样本的方差与标准差：

28 24 25 23 27 24 22 24 25 28

习题 2-2 B

1. 请你班上的每一位同学估计一下自己每天看电视花费的时间 (单位: min), 然后:
 - (1) 列出频率分布表, 画出频率分布直方图;
 - (2) 计算平均数 \bar{x} 、标准差 s ;
 - (3) 数出有多少数据落在区间 $(\bar{x}-2s, \bar{x}+2s)$ 内.
2. 如果两组数 x_1, x_2, \dots, x_n 和 y_1, y_2, \dots, y_n 的平均数分别是 \bar{x} 和 \bar{y} , 那么一组数 $x_1+y_1, x_2+y_2, \dots, x_n+y_n$ 的平均数是什么? 为什么?

2.3 变量的相关性

2.3.1

变量间的相关关系

变量与变量之间的关系常见的有两类：一类是确定性的函数关系，像正方形的边长 a 和面积 S 的关系。另一类是变量间确实存在关系，但又不具备函数关系所要求的确定性，它们的关系是带有随机性的。例如，人的身高并不能确定体重，但一般说来“身高者，体也重”。我们说身高与体重这两个变量具有**相关关系**。

怎样判断两个变量有没有相关关系，我们来看下面的例子。

例 设某地 10 户家庭的年收入和年饮食支出的统计资料如下表：

年收入 x /万元	2	4	4	6	6	6	7	7	8	10
年饮食支出 y /万元	0.9	1.4	1.6	2.0	2.1	1.9	1.8	2.1	2.2	2.3

由表中数据可以看出， y 有随 x 增加而增加的趋势，并且增加的趋势变缓，为了更清楚地看出 x 与 y 是否有相关关系，我们以年收入 x 的取值作横坐标，把年饮食支出 y 的相应取值作为纵坐标，在直角坐标系中描点 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 10$)，如图 2-8 所示。这样的图形叫做**散点图**。从图中可以直观地看出家庭年收入和年饮食支出之间具有相关关系，并且当年收入的值由小变大时，年支出的值也在由小变大，这种相关称为正相关。反之，如果一个变量的值由小变大时另一个变量的值由大变小，这种相关称为负相关。




图 2-8

练习 A

1. 5 个学生的数学和物理成绩如下表:

学生 \ 学科	A	B	C	D	E
数学	80	75	70	65	60
物理	70	66	68	64	62

画出散点图, 并判断它们是否有相关关系.

2. 下表给出了某校 12 名高一学生的身高 (单位: cm) 与体重 (单位: kg):

身高/cm	151	152	153	154	156	157	158	160	160	162	163	164
体重/kg	40	41	41	41.5	42	42.5	43	44	45	45	46	45.5

试画出散点图, 并观察它们是否有相关关系.

练习 B

某农场经过观测得到水稻产量和施化肥量的统计数据如下:

施化肥量 x	15	20	25	30	35	40	45
水稻产量 y	330	345	365	405	445	450	455

画出散点图, 判断它们是否有相关关系, 并考虑水稻的产量会不会随着化肥施用量的增加而一直增长.

2.3.2 两个变量的线性相关

看下面的例子.

例 1 下表是某小卖部 6 天卖出的热茶的杯数与当天天气温度的对比表.

温度 $t/^\circ\text{C}$	26	18	13	10	4	-1
杯数 Y	20	24	34	38	50	64

- (1) 将表中的数据画成散点图;
- (2) 你能从散点图中发现温度与饮料杯数近似成什么关系吗?

(3) 如果近似成线性关系的话, 请画出一条直线来近似地表示这种线性关系.

解: (1) 画出的散点图如图 2-9.

(2) 从图中可以发现温度和杯数具有相关关系. 当温度的值由小到大变化时, 杯数的值由大变小, 所以温度和杯数成负相关. 图中的数据点大致分布在一条直线的附近, 因此温度和杯数近似成线性相关关系.




图 2-9

(3) 根据不同的标准, 可以画出不同的直线来近似表示这种线性相关关系. 比如可以连接最左侧点和最右侧点得到一条直线 (图 2-10), 或者让画出的直线上方的点和下方的点数目相等 (图 2-11).




图 2-10




图 2-11

同学们也可以自己尝试制定标准来画出近似直线, 关键在于这一标准是否合理, 是否能够得到最佳的近似直线 (最优拟合直线).

思考与讨论

图 2-10 和图 2-11 中画出直线的标准合理吗? 怎样判别拟合的优劣程度呢?

由图 2-11 可见, 所有数据点都分布在一条直线附近. 显然这样的直线还可以画出许多条, 而我们希望找出其中的一条, 它能最好地反映 x 与 Y 之间的关系. 换言之, 我们要找出一条直线, 使这条直线“最贴近”已知的数据点. 记此直线方程为

$$\hat{y} = a + bx. \quad \text{①}$$

这里在 y 的上方加记号“ $\hat{\cdot}$ ”, 是为了区分 Y 的实际值 y , 表示当 x 取值 x_i ($i=1, 2, \dots, 6$) 时, Y 相应的观察值为 y_i , 而直线上对应于 x_i 的纵坐标是 $\hat{y}_i = a + bx_i$. ①式叫做 Y 对 x 的**回归直线方程**, b 叫做**回归系数**. 要确定回归直线方程①, 只要确定 a 与回归系数 b .

下面我们来研究回归直线方程的求法, 设 x, Y 的一组观察值为

$$(x_i, y_i) \quad i=1, 2, \dots, n,$$

且回归直线方程为

$$\hat{y} = a + bx.$$

当 x 取值 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 时, Y 的观察值为 y_i , 差 $y_i - \hat{y}_i (i=1, 2, \dots, n)$ 刻画了实际观察值 y_i 与回归直线上相应点纵坐标之间的偏离程度 (图 2-12). 我们希望这 n 个离差构成的总离差越小越好, 才能使所找的直线很贴近已知点.




图 2-12

一个自然的想法是把各个离差加起来作为总离差. 可是, 由于离差有正有负, 直接相加会相互抵消, 这样

就无法反映这些数据点的贴近程度, 即这个总离差不能用 n 个离差之和 $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)$ 来表示, 通常是用离差的平方和, 即

$$Q = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$$

作为总离差, 并使之达到最小. 这样, 回归直线就是所有直线中 Q 取最小值的那一条. 由于平方又叫二乘方, 所以这种使“离差平方和为最小”的方法, 叫做**最小二乘法**.

用最小二乘法求回归直线方程中的 a, b 有下面的公式:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2}, \quad (2)$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x},$$

其中 a, b 的上方加 “-”, 表示是由观察值按最小二乘法求得的估计值, \hat{b} 也叫**回归系数**.

\hat{a}, \hat{b} 求出后, 回归直线方程就建立起来了.

例 2 在某种产品表面进行腐蚀刻线试验, 得到腐蚀深度 Y 与腐蚀时间 x 之间相应的一组观察值如下表:

x/s	5	10	15	20	30	40	50	60	70	90	120
$Y/\mu\text{m}$	6	10	10	13	16	17	19	23	25	29	46

- (1) 画出表中数据的散点图;
- (2) 求 Y 对 x 的回归直线方程; (结果保留到小数点后 3 位数字)
- (3) 试预测腐蚀时间为 100 s 时腐蚀深度是多少.

解: (1) 散点图如图 2-13.




图 2-13

(2) 根据公式②求腐蚀深度 Y 对腐蚀时间 x 的回归直线方程的步骤如下:

I 先把数据列成表.

序号	x	Y	x^2	xy
1	5	6	25	30
2	10	10	100	100
3	15	10	225	150
4	20	13	400	260
5	30	16	900	480
6	40	17	1 600	680
7	50	19	2 500	950
8	60	23	3 600	1 380
9	70	25	4 900	1 750
10	90	29	8 100	2 610
11	120	46	14 400	5 520
Σ	510	214	36 750	13 910

II 计算 \hat{a} , \hat{b} 的值.

由上表分别计算 x , y 的平均数得 $\bar{x} = \frac{510}{11}$, $\bar{y} = \frac{214}{11}$. 代入公式②得 (注意: 不必把 \bar{x} , \bar{y} 化为小数, 以减小误差)

$$\hat{b} = \frac{13\,910 - 11 \times \frac{510}{11} \times \frac{214}{11}}{36\,750 - 11 \times \left(\frac{510}{11}\right)^2} \approx 0.304\,3 \approx 0.304,$$

$$\hat{a} = \frac{214}{11} - 0.304\,3 \times \frac{510}{11} \approx 5.346.$$

III 写出回归直线方程.

腐蚀深度 Y 对腐蚀时间 x 的回归直线方程为

$$\hat{y} = 0.304x + 5.346.$$

这里的回归系数 $\hat{b} = 0.304$ ，它的意义是：腐蚀时间 x 每增加一个单位(s)，深度 Y 平均增加 0.304 个单位(μm)。

(3) 根据上面求得的回归直线方程，当腐蚀时间为 100 s 时，

$$\hat{y} = 0.304 \times 100 + 5.346 \approx 35.75 (\mu\text{m}),$$

即腐蚀深度大约是 35.75 μm 。

例 3 设对变量 x ， Y 有如下观察数据：

x	151	152	153	154	156	157	158	160	160	162	163	164
Y	40	41	41	41.5	42	42.5	43	44	45	45	46	45.5

使用函数型计算器求 Y 对 x 的回归直线方程。(结果保留到小数点后 3 位数字)

解： 按键

MODE **3** **1** (进入线性回归计算状态)

SHIFT **CLR** **1** **=** (将计算器存储器设置成初始状态)

151 **,** 40 **DT** 152 **,** 41 **DT** 153 **,** 41 **DT** 154 **,** 41.5 **DT**

156 **,** 42 **DT** 157 **,** 42.5 **DT** 158 **,** 43 **DT** 160 **,** 44 **DT**

160 **,** 45 **DT** 162 **,** 45 **DT** 163 **,** 46 **DT** 164 **,** 45.5 **DT**

继续按下表按键

按键	显示结果
SHIFT S-VAR ▶▶ 1 =	-27.75938967
SHIFT S-VAR ▶▶ 2 =	0.449530516

即 $\hat{a} \approx -27.759$ ， $\hat{b} \approx 0.450$ 。

所以 Y 对 x 的回归直线方程为

$$\hat{y} = 0.450x - 27.759.$$



探索与研究

学习使用工作表软件计算回归直线方程。



练习A

1. 什么是最小二乘法, 回归直线方程中的 b 的含义是什么?
2. 求出例 1 的回归直线方程, 如果某天的气温是 5°C , 预测这天小卖部卖出热茶的杯数. (结果保留到小数点后 3 位数字)



练习B

1. 设对变量 x, Y 有如下观察数据:

x	-2.0	0.6	1.4	1.3	0.1	-1.6	-1.7	0.7	-1.8
Y	-6.1	-0.5	7.2	6.9	-0.2	-2.1	-3.9	3.8	-7.5

试求 Y 对 x 的回归直线方程. (结果保留到小数点后 3 位数字)

2. 1971 年至 1980 年, 某城市居民的年收入金额与皮鞋销售额如下表:

年度	年收入 x /亿元	皮鞋销售额 Y /万元
1971	32.2	25.0
1972	31.1	30.0
1973	32.9	34.0
1974	35.8	37.0
1975	37.1	39.0
1976	38.0	41.0
1977	39.0	42.0
1978	43.0	44.0
1979	44.6	48.0
1980	46.0	51.0

求 Y 对 x 的回归直线方程. (结果保留到小数点后 3 位数字)

习题 2-3

A

1. 某工厂在一年中月总成本 Y (万元) 与该月总产量 x (万件) 有如下一组数据:

x /万件	1.08	1.12	1.19	1.28	1.36	1.48	1.59	1.68	1.80	1.87	1.98	2.07
Y /万元	2.65	2.37	2.40	2.55	2.64	2.75	2.92	3.03	3.14	3.26	3.36	3.50

- (1) 画出散点图;
 (2) 求月总成本 Y 对月总产量 x 的回归直线方程. (结果保留到小数点后 3 位数字)

2. 某 5 名学生的数学和化学成绩如下表:

学生	A	B	C	D	E
学科					
数学成绩 x	88	76	73	66	63
化学成绩 Y	78	65	71	64	61

- (1) 画出散点图;
 (2) 求化学成绩 Y 对数学成绩 x 的回归直线方程. (结果保留到小数点后 3 位数字)

习题 2-3 B

1. 某公司 1985~1997 年所付利息 (单位: 万元) 资料如下:

年份	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
利息	3.10	2.95	3.00	2.79	2.75	2.60	2.40	2.41	2.30	2.15	2.14	2.00	1.95

试确定利息对年份的回归直线方程. (结果保留到小数点后 3 位数字)

2. 某矿山采煤的单位成本 Y 与采煤量 x 有关, 其数据如下:

采煤量/千吨	289	298	316	322	327	329	329	331	350
单位成本/元	43.5	42.9	42.1	39.6	39.1	38.5	38.0	38	37

- (1) 作出散点图;
 (2) 求出 Y 对 x 的回归直线方程. (结果保留到小数点后 3 位数字)



实习作业

前面我们学习了统计学的一些基本知识，怎样把理论知识运用到实践中呢？为了研究、解决某些实际问题，通常要去调查情况，收集数据，然后根据统计知识对所得的数据进行整理、分析和计算，得出一定的结论。

例 实习作业：为了了解某校高一年级 400 名学生的身高情况，决定抽取 80 名进行调查。

解：按下面的步骤完成实习作业：

(1) 确定总体和样本容量。

总体是某校高一年级全体 400 名学生身高数据（单位：cm），从总体中抽取 80 个数据作为样本。

(2) 确定抽样的方法，并抽取样本。

采用随机数表法，把 400 名学生依次编号为 001, 002, ..., 400. 从随机数表中抽取 80 个满足要求的号码，再查阅相应的 80 名同学的体检表，记录其身高数据。

(3) 计算和分析数据，写出实习报告。

实习报告

年 月 日

题目	了解某校高一年级学生的身高情况
具体要求	从某校 400 名高一学生中抽取 80 名学生作为样本，列样本的频率分布表，绘制频率分布直方图和频率分布折线图，计算样本的平均数和标准差，并估计学校高一学生身高和身高波动情况。
抽样方法	采用随机数表法，把 400 名学生依次编号为 001, 002, ..., 400. 从随机数表中抽取 80 个满足要求的号码，通过学校医务室查阅相应的 80 名同学的体检表，记录其身高数据。
样本数据 单位：cm	163 179 170 177 163 185 165 183 171 188 168 174 165 168 166 188 166 154 181 170 156 160 170 182 169 157 168 173 158 167 161 173 177 170 189 172 164 169 163 165 175 173 184 156 170 168 155 174 178 166 174 157 162 161 173 180 171 160 166 170 160 175 168 152 183 173 157 171 148 169 170 162 168 176 167 158 171 170 163 172

续表


题目	了解某校高一年级学生的身高情况			
数据处理图表	频率分布表			
	分组	个数累计	频数	频率
	147.5~151.5	1	1	0.012 5
	151.5~155.5	3	3	0.037 5
	155.5~159.5	7	7	0.087 5
	159.5~163.5	11	11	0.137 5
	163.5~167.5	10	10	0.125
	167.5~171.5	21	21	0.262 5
	171.5~175.5	12	12	0.15
	175.5~179.5	5	5	0.062 5
	179.5~183.5	5	5	0.062 5
	183.5~187.5	2	2	0.025
187.5~191.5	3	3	0.037 5	
根据频率分布表可以画出频率分布直方图和频率分布折线图				
样本的数字特征	样本平均数 $\bar{x}=168.91$, 样本标准差 $s=8.63$			
结论	根据样本平均数和标准差可以估计, 某校高一年级学生的平均身高约为 168.91 cm, 标准差约为 8.63 cm. 从频率分布直方图可以估计全校高一学生身高数据的分布情况.			

【练习】

1. 了解本校高一年级学生的某项数量指标 (如体重、视力、某项体育运动的成绩等), 要求用适当的方法抽取一个容量为 50 的样本, 写出实习报告.
2. 了解周围社会生活中的某项数量指标 (如某商店的日营业额、某路段的车流量等), 并要求用适当方法抽取一个容量为 40 的样本, 写出实习报告.

本章小结

I 知识结构



II 思考与交流

1. 统计学有两方面的工作，一方面是收集数据，另一方面是分析数据。学完这一章，你对统计已经有了基本的认识，试结合生活实际提出并解决一个统计问题。
2. 样本数据的取得要求有随机性，通过观察一些统计案例，说明随机抽样的必要性与作用。
3. 随机抽样方法有简单随机抽样、系统抽样和分层抽样等，这几种抽样方法有什么联系，它们分别适用于哪些场合。
4. 做实验、查阅资料、设计调查问卷等是收集数据的常用方法，除此之外你还能想到别的方法吗？使用这些办法时要注意符合哪些要求？
5. 统计的一个特征是通过部分的数据来推测全体数据的性质。由样本数据可以
 - (1) 列出频率分布表、画出频率分布直方图、频率分布折线图；
 - (2) 求出样本数据的平均数、标准差等数字特征。
 通过样本数据的统计图表和数字特征，我们能够估计总体哪些有用的信息？当样本数据变化时，总体的这些信息也会变化吗？应怎样理解样本频率分布和数字特征的随机性？把你的理解与同学们进行交流。
6. 借助散点图可以直观地看出两个变量之间是否有相关关系。用最小二乘法思想建立的

线性回归方程，能定量地描述两个变量的关系。接受高等教育能得到更多的收入吗？一个人的身高和体重有怎样的关系？用你学到的知识来解释这样一些有趣的问题。

III 巩固与提高

1. 从某片森林中随机抽取 35 株树木，观测这 35 株树高，得到下列数据(单位: m):

22.3 21.2 19.2 16.6 23.1 23.9 24.8 25.1 25.2
 24.8 23.9 23.2 23.3 21.4 19.8 18.3 20.0 21.5
 18.7 22.4 26.6 23.9 24.8 18.8 27.1 20.6 25.0
 22.5 23.5 23.9 25.3 23.5 22.6 21.5 20.6

说出总体、个体、样本、样本容量，计算样本平均数和样本标准差。

2. 在一篇英语文章中，从正文的第 1 个单词开始，每隔 3 个单词取 1 个单词，共取 100 个单词，数出各个单词所含字母个数，并就字母个数列出频率分布表、画出频率分布直方图。

3. 用一标准尺测量某一零件长度，量了 20 次，其结果如下(单位: mm):

215 227 216 192 207 207 214 218 205 200
 187 185 202 218 195 215 206 202 208 210

试估计该批零件中零件长度的平均数和标准差。

4. 某服装店一年中每月销售额(单位: 万元)如下表:

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
销售额	583	1016	378	438	484	512	470	465	459	517	461	508

试估计该商店月销售额的平均数和标准差。

5. 现对 x , Y 有如下观测数据:

x	18	25	30	39	41	42	49	52
Y	3	5	6	7	8	8	9	10

- (1) 作出散点图;
 (2) 试求 Y 对 x 的线性回归方程。(结果保留到小数点后 3 位数字)

IV 自测与评估

1. 为了了解中学生的身体发育情况，从同龄的女中学生中随机抽取 60 名测量身高，结果如下(单位: cm):

167 154 159 166 169 159 156 166 162 158
 159 156 166 160 164 160 157 156 157 161
 158 158 153 158 164 158 163 158 153 157
 162 162 159 154 165 166 157 151 146 151
 158 160 165 158 163 163 162 161 154 165
 162 162 159 157 159 149 164 168 159 153

- (1) 列出样本的频率分布表, 画出频率分布直方图;
 (2) 计算样本的平均数和标准差;
 (3) 由样本数据估计总体中有多少数据落入区间 $(\bar{x}-2s, \bar{x}+2s)$.
2. 从一批炮弹中, 随机抽取 10 发进行射击, 射程数据 (单位: m) 为:

5 325 5 331 5 320 5 290 5 314 5 320 5 306 5 340 5 352 5 328

- (1) 指出总体、个体、样本、样本容量;
 (2) 计算样本的平均数和标准差.
3. 现对 x, Y 有如下观测数据:

x	7.0	4.0	8.5	9.5	3.0	1.0	8.0	5.0
Y	11.0	8.5	13.5	15.5	4.5	3.5	13.0	7.0

- (1) 作出散点图;
 (2) 试求 Y 对 x 的线性回归方程. (结果保留到小数点后 3 位数字)



蚂蚁和大象谁的力气更大

在小时候你可能听过关于蚂蚁和大象谁的力气更大的故事，论搬起的物体的重量，蚂蚁与大象的力气不可同日而语，但是这样比较显然对蚂蚁并不公平。换个标准来比，如果按搬起自身重量的倍数的大小来比较，则蚂蚁的力气远远超过大象。

在统计中也常常会遇到这样不同变量之间的比较，这时就需要有一个“合理的标准”。我们知道，标准差是样本数据相对于平均数的平均波动幅度的度量，它能够描述样本数据中各数据同平均数的离差的大小，有时也可用作比较的标准。拿同一科目的不同次的考试来说，由于试卷的难易程度很难一致，我们还可以用“标准分数”来考查学

习成绩。假设一次考试中，全班平均分 $\bar{x}=80$ ，标准差 $s=10$ ，小明的成绩 $X=70$ 分，说明小明的成绩比平均分低一个标准差。如果定义标准分数为样本数据比平均数高多少个标准差，则小明的标准分数 $=\frac{X-\bar{x}}{s} =$

$\frac{70-80}{10} = -1$ 。如果另外一次考试中小明的成绩 $X=80$ 分，而全班平均分 $\bar{x}=85$ ，标准差 $s=5$ ，可算出小明的标准分数仍然为 -1 。这样，与通常的考试分数相比，小明的标准分数更能反映出他与全班平均水平的差别大小。


附录

随机数表

78226	85384	40527	48987	60602	16085	29971	61279
43021	92980	27768	26916	27783	84572	78483	39820
61459	39073	79242	20372	21048	87088	34600	74636
63171	58247	12907	50303	28814	40422	97895	61421
42372	53183	51546	90385	12120	64042	51320	22983
81500	13219	57941	74927	32798	98600	55225	42059
59408	66368	36016	26247	25965	49487	26968	86021
77681	83458	21540	62651	69424	78197	20643	67297
76413	66306	51671	54964	87683	30372	39469	97434
48306	32560	19098	13843	70490	19383	21278	90912
40402	60831	15596	95509	23567	78961	46509	33267
82724	32555	52400	15020	12760	47439	67841	10546
20997	81462	41620	77512	39978	60900	60167	62088
37711	26727	62908	75539	99292	13361	99768	97579
24492	20561	77964	72344	43000	33786	90807	22267
69944	91085	47328	58466	95651	75217	86800	88815
55325	76970	30496	88609	31008	76317	90818	34144
33719	89319	76617	67400	85326	95814	52133	91900
56291	41537	67848	74976	60677	35455	11769	38484
64109	59218	13519	36121	64311	81138	13814	50213
89568	86620	31868	62342	89855	31148	97530	72827
16639	71496	82986	66859	81878	77144	20930	10519
89821	55359	94168	85859	22203	90515	31903	39726
10829	74291	86950	26957	66987	83572	63950	44605
48018	90777	89102	10970	18592	87121	92613	23810
33021	44709	79262	33116	80907	77689	69696	48420
77713	32822	64679	94095	95735	84535	74703	82890
25853	30963	76729	87613	65538	68978	13157	78834
64145	71516	11716	58309	89501	59717	56086	37459
68585	22783	22621	54263	41128	12663	82362	61855



上海：降水概率 63%



香港：降水概率 84%

第三章 概 率

3.1

事件与概率

3.2


古典概型

3.3

随机数的含义与应用

3.4

概率的应用



北京：降水概率 55%

五千万幸运儿“横空出世”

■ 记者梁红英报道

本报讯 2月3日晚6时19分，一彩民购买的“江浙沪大乐透”彩票，同时投中10注一等奖，独揽48 571 620元巨额奖金，创下中国彩票史上个人一次性奖额之最。

……据有关人士介绍，该彩民当时花了200元买下100注“江浙沪大乐透”彩票，分成10组，每组10注，每组的自选号码相同。结果，其中1组所选号码与前晚“江浙沪大乐透”2004015期开奖号码完全一致。


■ 记者江世亮报道

本报讯 ……对这种似乎不可能发生事件的发生，从数学概率论上将作何解释？为此记者于昨日午夜电话连线采访了本市一位数学建模专家……博士说，以他现在不完全掌握的情况来分析，像这位幸运者同时获得10个大奖的概率，可称得上一次万亿分之一的事件，通俗讲就是接近于0。……国外的中奖者完全是基于运气，很多人往往是因为找不出零钱，而在加油站等处随手买一张而中的奖。

上面是文汇报2004年2月5日登载的两条消息，对其中提到的“一次万亿分之一的事件”，我们该作何理解呢？

天气预报说“明天降雨的概率是80%”，我们明天出门要不要带伞？收音机里广播报道今冬某地“流行性感冒的发病率为10%”，我们这里要不要采取预防措施？……对这些在传播媒体上出现的数字80%，10%等，我们该作何理解呢？

本章介绍概率的概念和计算概率的一些初步知识，学过本章以后，可以较好地把握上述概率 10^{-12} （万亿分之一），80%，10%的含义，从而正确对待现实生活中遇到的“买彩票中大奖”“出门带不带伞”“要不要预防流感”等问题。



3.1 事件与概率

3.1.1 随机现象

在自然界和人类社会里，经常会遇到两类不同的现象：必然现象和随机现象。

我们知道，把一石块抛向空中，它会掉到地面上来；我们生活的地球，每天都在绕太阳转动；一个人随着岁月的消逝，一定会衰老、死亡……这类现象称为**必然现象**。必然现象是在一定条件下必然发生某种结果的现象。

另一类现象称为**随机现象**，它们具有这样的特点：当在相同的条件下多次观察同一现象，每次观察到的结果不一定相同，事先很难预料哪一种结果会出现。

下面举 4 个例子。

例 1 我们通常把硬币上刻有国徽的一面称为正面，现在任意掷一枚质地均匀的硬币，那么可能出现“正面朝上”，也可能出现“反面朝上”，究竟得到哪一种结果，不可能事先确定，这是一种随机现象。



例 2 一名中学生在篮球场的罚球线练习投篮，对于每次投篮，他可能投进，也可能投不进。即使他打篮球的技术很好，我们最多只能说，他投进的可能性很大，并不能保证每投必进，所以这也是一种随机现象。

例 3 在城市中，当我们走到装有交通信号灯的十字路口时，可能遇到绿灯，这时可以快速穿过马路，也可能遇到红灯或黄灯，这时就应该停下。一般来说，行人在十字路口看到的交通信号灯颜色，可以认为是一种随机现象。

例 4 在 10 个同类产品，有 8 个正品、2 个次品。从中任意抽出 3 个检验，那么，“抽到 3 个正品”“抽到 2 个次品”“抽到 1 个次品”三种结果都有可能出现，至于出现哪一种结果，由于是任意抽取，抽取前无法预料，当然这是一种随机现象。

为了探索随机现象的规律性，需要对随机现象进行观察。我们把观察随机现象或为了某种目的而进行的实验统称为**试验**，把观察结果或实验结果称为试验的结果。为了讨

论问题方便, 在本章中我们赋予“试验”这一词较广泛的含义. 例 1 的掷硬币, 例 2 的中学生投篮, 例 3 的观察交通信号灯颜色, 例 4 的产品抽样检验等都是试验. 此外, 像战士打靶, 明天会不会下雨, 本地的足球队明天比赛会不会进球, 甚至小孩在做掷骰子游戏……都可以看成试验.



练习 A

判断以下现象是否是随机现象:

- (1) 某路口单位时间内发生交通事故的次数;
- (2) 冰水混合物的温度是 0°C ;
- (3) 三角形的内角和为 180° ;
- (4) 一个射击运动员每次射击的命中环数.



练习 B

请举出你遇到的三个随机现象的例子.

3.1.2

事件与基本事件空间

当我们在同样的条件下重复进行试验时, 有的结果始终不会发生, 它称为**不可能事件**; 有的结果在每次试验中一定会发生, 它称为**必然事件**. 在试验中可能发生, 也可能不发生的结果称为**随机事件**.

如果某个练习投篮的中学生决定投篮 5 次, 那么“他投进 6 次”是不可能事件, “他投进的次数比 6 小”是必然事件, “他投进 3 次”是随机事件.

在上一小节例 4 中, 也可以列出一些不可能事件、必然事件、随机事件. 例如, “抽到 3 个次品”是不可能事件, “至少抽到 1 个正品”是必然事件, “没有抽到次品”是随机事件……

通常用大写英文字母 A, B, C, \dots 来表示随机事件, 随机事件可以简称为**事件**. 为了叙述起来文字简洁些, 我们有时讲到事件时, 其中可能包含不可能事件和必然事件的意思, 一般都不另作说明了.

在一次试验中, 我们常常要关心的是所有可能发生的基本结果, 它们是试验中不能再

分的最简单的随机事件，其他事件可以用它们来描绘，这样的事件称为**基本事件**，所有基本事件构成的集合称为**基本事件空间**，基本事件空间常用大写希腊字母 Ω 表示。

例如，掷一枚硬币，观察硬币落地后哪一面向上。这个试验的基本事件空间就是集合{正面向上，反面向上}，即

$$\Omega = \{\text{正面向上}, \text{反面向上}\},$$

或简记为 $\Omega = \{\text{正}, \text{反}\}$ 。这个试验有两个基本事件：“正面向上”和“反面向上”。

掷一颗骰子，观察掷出的点数，这个试验的基本事件空间

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

其中1, 2, 3, 4, 5, 6分别代表骰子掷出点数为1, 2, 3, 4, 5, 6这6个基本事件。

一先一后掷两枚硬币，观察正反面出现的情况，基本事件空间

$$\Omega = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反})\},$$

它有4个基本事件。(正, 正)代表第1和第2枚硬币都出现正面，(正, 反)代表第1枚硬币出现正面而第2枚硬币出现反面，(反, 正)代表第1枚硬币出现反面而第2枚硬币出现正面，(反, 反)代表第1和第2枚硬币都出现反面。

对于有些问题，除了要知道试验可能出现的每一个结果外，我们还要了解与这些可能出现的结果有关的一些事件。例如，在一先一后掷两次硬币的试验中，我们要了解“至少有一次出现正面”这个事件。通过观察，我们不难发现“至少有一次出现正面”这个事件可以看成是由基本事件

$$(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正})$$

组成的集合，若设事件 $A =$ “至少有一次出现正面”，那么

$$A = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正})\}.$$

假如掷出了(正, 正)，显然可以说，“至少有一次出现正面”发生了，或者说事件 A 发生了；假如掷出了(反, 反)，就说事件 A 没有发生。一般地说，如果在一次试验中，出现的结果是集合 A 中的某个基本事件，我们就说事件 A 发生了，否则就说事件 A 没有发生。

我们可以把随机事件理解为基本事件空间的子集。例如，在上面掷一颗骰子观察掷出点数的试验中，基本事件空间

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

如果设 $A = \{2, 4, 6\}$ ，那么 $A \subseteq \Omega$ ， A 是 Ω 的一个子集，事件 A 就是表示“掷出偶数点”这一结果。如果再设 $B = \{5, 6\}$ ，那么 $B \subseteq \Omega$ ， B 也是 Ω 的一个子集，事件 B 表示“掷出点数大于4”。

例1 一个盒子中装有10个完全相同的小球，分别标以号码1, 2, ..., 10，从中任取一球，观察球的号码。写出这个试验的基本事件和基本事件空间。

解：这个试验的基本事件是取得的小球号码为 i ， $i=1, 2, \dots, 10$ 。

基本事件空间 $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$ 。

例2 连续掷3枚硬币，观察落地后这3枚硬币出现正面还是反面。

(1) 写出这个试验的基本事件空间；

- (2) 求这个试验的基本事件的总数;
 (3) “恰有两枚正面向上”这一事件包含哪几个基本事件?

解: (1) 用类似上面一先一后掷两枚硬币时基本事件的记法, 这个试验的基本事件空间

$\Omega = \{(\text{正}, \text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{正}, \text{反}), (\text{正}, \text{反}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}, \text{正}), (\text{反}, \text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反}, \text{反})\};$

- (2) 基本事件的总数是 8;
 (3) “恰有两枚正面向上”包含以下 3 个基本事件:
 (正, 正, 反), (正, 反, 正), (反, 正, 正).



练习 A

- 做投掷一颗骰子试验, 观察骰子出现的点数, 用基本事件空间的子集写出下列事件:
 - “出现奇数点”;
 - “点数大于 3”.
- 做投掷 2 颗骰子试验, 用 (x, y) 表示结果, 其中 x 表示第 1 颗骰子出现的点数, y 表示第 2 颗骰子出现的点数. 写出:
 - 试验的基本事件空间;
 - 事件“出现点数之和大于 8”;
 - 事件“出现点数相等”;
 - 事件“出现点数之和大于 10”.
- 做试验“从 0, 1, 2 这 3 个数字中, 不放回地取两次, 每次取一个, 构成有序数对 (x, y) , x 为第 1 次取到的数字, y 为第 2 次取到的数字”:
 - 写出这个试验的基本事件空间;
 - 求这个试验基本事件的总数;
 - 写出“第 1 次取出的数字是 2”这一事件.



练习 B

- 写出下列试验的基本事件空间:
 - 种下一粒种子, 观察发芽情况;
 - 甲、乙两队进行一场足球比赛, 观察甲队的比赛结果 (包括平局);
 - 从含有 15 件次品的 100 件产品中任取 5 件, 观察其中次品数.
- 投掷一颗骰子, 观察掷出的点数, 令 $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2\}$, 把 A, B 看成数的集合, 试用语言叙述下列表达式对应事件的意义:
 - $A \cap B$;
 - $A \cup B$.

3.1.3

频率与概率

随机事件在试验中可能发生，自然产生发生的可能性有多大的问题，我们还是从最简单的试验——掷硬币谈起。虽然我们不能预先判断出现正面向上，还是反面向上，但是假如硬币均匀，直观上可以认为出现正面与反面的机会相等，即在大量试验中出现正面的频率应接近于 0.5。

例 1 我们一起来掷硬币。

把全班分成十几个小组，每个小组 4~5 人。各小组把一枚均匀硬币至少掷 100 次，观察掷出正面向上的次数，然后把试验结果及计算结果填入下表：

小组编号	抛掷次数(n)	正面向上次数(m)	正面向上频率($\frac{m}{n}$)

当全班做完这一试验后，把试验结果公布在黑板上，请大家谈谈事件“正面向上”的发生有没有什么规律可循？

历史上有些学者还做了成千上万次掷硬币的试验，结果如下表所示：

试验者	抛掷次数(n)	正面向上次数(m)	正面向上频率($\frac{m}{n}$)
棣莫佛	2 048	1 061	0.518 1
蒲 丰	4 040	2 048	0.506 9
费 勒	10 000	4 979	0.497 9
皮尔逊	12 000	6 019	0.501 6
皮尔逊	24 000	12 012	0.500 5

我们可以设想有 1 000 个人投掷硬币，如果每人投 5 次，计算每个人投出正面的频率，在这 1 000 个频率中，一般说，0，0.2，0.4，0.6，0.8，1 都会有，而且会有不少是 0 或 1；如果要求每个人投 20 次，这时频率为 0，0.05，0.95，1 的将会变少，多数频率在 0.35~0.65 之间，甚至比较集中在 0.4~0.6 之间；如果要求每个人投掷 1 000 次，这时绝大多数的频率会集中在 0.5 的附近，和 0.5 有较大差距的频率值也会有，但这样的频率值很少。而且随着投掷次数的增多，频率越来越明显地集中在 0.5 附近。当然，即使投掷的次数再多，也不能绝对排除出现与 0.5 差距较大的频率值，只不过这种情形极少。

人们经过大量试验和实际经验的积累逐渐认识到：在多次重复试验中，同一事件发生的频率在某一个数值附近摆动，而且随着试验次数的增加，一般摆动幅度越小，而且观察到的大偏差也越少，频率呈现一定的稳定性。频率的稳定性揭示出随机事件发生的可能性有一定的大小。事件的频率稳定在某一数值附近，我们就用这一数值表示事件发生的可能

性大小.

一般地, 在 n 次重复进行的试验中, 事件 A 发生的频率 $\frac{m}{n}$, 当 n 很大时, 总是在某个常数附近摆动, 随着 n 的增加, 摆动幅度越来越小, 这时就把这个常数叫做事件 A 的概率, 记作 $P(A)$.

从概率的定义中, 我们可以看出随机事件 A 的概率 $P(A)$ 满足

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

这是因为在 n 次试验中, 事件 A 发生的频数 m 满足 $0 \leq m \leq n$, 所以 $0 \leq \frac{m}{n} \leq 1$. 当 A 是必然事件时, $P(A)=1$, 当 A 是不可能事件时, $P(A)=0$.

从定义中, 我们还可以看出, 概率是可以通过频率来“测量”的, 或者说频率是概率的一个近似. 在前述掷硬币的例子中, 经过前人的反复多次试验, 出现正面的频率逐渐稳定到 0.5, 那么我们就得到出现正面的概率是 0.5. 这件事情其实质与测量长度一样平常. 给定一根木棒, 谁都不怀疑它有“客观”的长度, 长度是多少? 我们可以用尺或仪器去测量, 不论尺或仪器多么精确, 测得的数值总是稳定在木棒真实的“长度”值的附近. 事实上, 人们也是把测量所得的值当作真实的“长度”值. 这个类比有助于我们理解概率和频率之间的内在关系.

概率的这种定义叫做**概率的统计定义**. 在实践中很多时候采用这种方法求事件的概率. 有了概率的统计定义, 我们就可以比较不同事件发生的可能性大小了.

例 2 为了确定某类种子的发芽率, 从一大批种子中抽出若干批做发芽试验, 其结果如下:

种子粒数	25	70	130	700	2 000	3 000
发芽粒数	24	60	116	639	1 806	2 713
发芽率	0.96	0.857	0.892	0.913	0.903	0.904

从以上的数据可以看出, 这类种子的发芽率约为 0.9.

比较例 1 和例 2 的结果, 我们可以说, 这类种子的发芽率比掷一枚硬币掷出正面向上的概率要大得多.

思考与讨论

“某彩票的中奖概率为 $\frac{1}{1\,000}$ ” 是否意味着买 1 000 张彩票就一定能中奖?

从概率的统计定义出发, 我们先来考虑此题的简化情形: 在投掷一枚均匀硬币的随机试验中, 正面出现的概率是 $\frac{1}{2}$, 这是否意味着投掷 2 次硬币就会出现一次正面呢?

根据经验,我们投掷2次硬币有可能一次正面也不出现,即出现2次反面的情形.但是在大量重复掷硬币的试验中,比如掷10 000次硬币,则出现正面的次数约为5 000次.

买1 000张彩票相当于做1 000次试验,结果可能是一次奖也没中,或者中一次奖,或者多次中奖.所以“彩票中奖概率为 $\frac{1}{1\,000}$ ”并不意味着买1 000张彩票就一定能中奖.只有当所买彩票的数量 n 非常大时,我们可以看成大量重复买彩票这个试验,中奖的次数约为 $\frac{n}{1\,000}$ (比如说买1 000 000张彩票,则中奖的次数约为1 000),并且 n 越大,中奖次数越接近于 $\frac{n}{1\,000}$.



练习A

1. 学生甲在求事件 A 的概率时,算得事件 A 的概率 $P(A)=1.2$,学生乙看了后说“你一定算错了.”试问乙的根据是什么?
2. 某射击手在同一条件下进行射击,结果如下:

射击次数(n)	10	20	50	100	200	500
击中靶心次数(m)	8	19	44	92	178	455
击中靶心频率($\frac{m}{n}$)						

- (1) 计算表中击中靶心的各个频率;
- (2) 这个射手射击一次,击中靶心的概率约是多少?
3. 某篮球运动员的投篮命中率是90%,学生丙理解为他投篮100次一定有90次投中,10次投不中.这样理解对不对?



练习B

1. 用事件出现的频率与事件的概率之间的关系说明:
 - (1) 不可能事件的概率是0;
 - (2) 必然事件的概率是1.
2. 一个盒子里装有许多围棋子,黑白各若干.从中任意摸出一颗棋子,记下棋子颜色,然后放回盒中,混合均匀,再摸一子,记下颜色.如此重复多次,统计摸得白子的次数,计算摸得白子的频率,推算摸得白子的概率.然后倒出全部棋子,数一数黑白棋子的个数.看你得到的概率与白子在所有棋子中所占比例有什么关系?

3.1.4 概率的加法公式

概率的加法公式是计算概率的一个最基本的公式, 根据它可以计算一些较为复杂事件的概率. 我们先通过实例引入两个关于事件的概念: 互斥事件与事件的并.

例 1 抛掷一颗骰子, 观察掷出的点数. 设事件 A 为“出现奇数点”, B 为“出现 2 点”, 已知 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{6}$, 求“出现奇数点或 2 点”的概率.

这里的事件 A 和事件 B 不可能同时发生. 这种不可能同时发生的两个事件叫做 **互斥事件** (或称 **互不相容事件**).

设事件 C 为“出现奇数点或 2 点”, 它也是一个随机事件. 事件 C 与事件 A, B 的关系是: 若事件 A 和事件 B 中至少有一个发生, 则 C 发生; 若 C 发生, 则 A, B 中至少有一个发生. 我们称事件 C 为 A 与 B 的 **并** (或 **和**).

一般地, 由事件 A 和 B 至少有一个发生 (即 A 发生, 或 B 发生, 或 A, B 都发生) 所构成的事件 C , 称为事件 A 与 B 的 **并** (或 **和**), 记作 $C = A \cup B$. 事件 $A \cup B$ 是由事件 A 或 B 所包含的基本事件组成的集合.

如图 3-1 中阴影部分所表示的就是 $A \cup B$.




图 3-1

假定 A, B 是互斥事件, 在 n 次试验中, 事件 A 出现的频数是 n_1 , 事件 B 出现的频数是 n_2 , 则事件 $A \cup B$ 出现的频数正好是 $n_1 + n_2$, 所以事件 $A \cup B$ 的频率为

$$\frac{n_1 + n_2}{n} = \frac{n_1}{n} + \frac{n_2}{n},$$

而 $\frac{n_1}{n}$ 是事件 A 出现的频率, $\frac{n_2}{n}$ 是事件 B 出现的频率. 因此, 如果用 μ_n 表示在 n 次试验中事件出现的频率, 则总有

$$\mu_n(A \cup B) = \mu_n(A) + \mu_n(B).$$

由概率的统计定义, 可知

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B). \quad \textcircled{1}$$

一般地, 如果事件 A_1, A_2, \dots, A_n 两两互斥 (彼此互斥), 那么事件 “ $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ ” 发生 (是指事件 A_1, A_2, \dots, A_n 中至少有一个发生) 的概率, 等于这 n 个事件分别发生的概率和, 即

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n). \textcircled{1}'$$

公式①或公式①'叫做**互斥事件的概率加法公式**.

例1中事件C:“出现奇数点或2点”的概率是事件A:“出现奇数点”的概率与事件B:“出现2点”的概率之和,即

$$P(C) = P(A) + P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

例2 在数学考试中,小明的成绩在90分以上的概率是0.18,在80~89分的概率是0.51,在70~79分的概率是0.15,在60~69分的概率是0.09.计算小明在数学考试中取得80分以上成绩的概率和小明考试及格的概率?

解:分别记小明的考试成绩在90分以上,在80~89分,在70~79分,在60~69分为事件B, C, D, E.这4个事件是彼此互斥的.根据公式①小明的考试成绩在80分以上的概率是

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) = 0.18 + 0.51 = 0.69;$$

小明考试及格的概率,即成绩在60分以上的概率.由公式①'

$$\begin{aligned} P(B \cup C \cup D \cup E) &= P(B) + P(C) + P(D) + P(E) \\ &= 0.18 + 0.51 + 0.15 + 0.09 = 0.93. \end{aligned}$$

在这个例题中,令

$$A = \text{“小明考试及格”}, \bar{A} = \text{“小明考试不及格”},$$

显然A与 \bar{A} 是互斥事件,且A或 \bar{A} 必有一个发生,即

$$A \cup \bar{A} = \Omega.$$

像这样不能同时发生且必有一个发生的两个事件叫做**互为对立事件**.事件A的对立事件记作 \bar{A} .图3-2中的阴影部分表示事件A的对立事件.由于A与 \bar{A} 是互斥事件,所以 $P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$,又由 Ω 是必然事件得到 $P(\Omega) = 1$.所以, $P(A) + P(\bar{A}) = 1$,即




图3-2

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A). \textcircled{2}$$

这个公式为我们求出 $P(A)$ 提供了一种方法.当我们直接求 $P(A)$ 有困难时,常可以转化为求 $P(\bar{A})$.

在例2中,如果求“小明考试不及格”的概率,则由公式②得

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.93 = 0.07.$$

即小明考试不及格的概率为0.07.



练习 A

- 互斥事件是不是对立事件？对立事件一定互斥事件吗？举例说明。
- 从一堆产品（其中正品与次品都多于 2 件）中任取 2 件，观察正品件数和次品件数，判断下列每对事件是不是互斥事件，如果是，再判断它们是不是对立事件：
 - 恰好有 1 件次品和恰好有两件次品；
 - 至少有 1 件次品和全是次品；
 - 至少有 1 件正品和至少有 1 件次品；
 - 至少有 1 件次品和全是正品。



练习 B

- 在某一时期内，一条河流某处的年最高水位在各个范围内的概率如下：

年最高水位	低于 10 m	10~12 m	12~14 m	14~16 m	不低于 16 m
概率	0.1	0.28	0.38	0.16	0.08

计算在同一时期内，河流这一处的年最高水位在下列范围内的概率：

- 10~16 m；
 - 低于 12 m；
 - 不低于 14 m。
- 在一次商店促销抽奖活动中，假设中一等奖的概率是 0.1，中二等奖的概率是 0.2，中三等奖的概率是 0.4，计算在这次抽奖活动中：
 - 中奖的概率是多少？
 - 不中奖的概率是多少？

习题 3-1 A

- 判断题：
 - 必然事件是基本事件空间的某一真子集； ()
 - 概率是随机事件发生的可能性大小的一种度量； ()

- (3) 在一个试验中, 两个事件的并的概率可以大于 1. ()
2. 同时掷出两枚骰子, 观察掷得的点数和, 写出这个试验的基本事件空间.
3. 气象台预报“本市明天降雨概率是 80%”, 如下理解正确吗?
- (1) 本市明天将有 80% 的地区降雨;
 - (2) 本市明天将有 80% 的时间降雨;
 - (3) 明天出行不带雨具肯定要淋雨;
 - (4) 明天出行不带雨具淋雨的可能性很大.

习题 3-1

B

1. 根据以往甲、乙两人下象棋比赛中的记录, 甲取胜的概率是 0.5, 和棋的概率是 0.1, 那么乙取胜的概率是多少?
2. 收集一些资料, 谈谈你对随机现象的认识.

3.2 古典概型

3.2.1

古典概型

前面我们用随机事件发生的频率来近似概率. 对于一些特殊类型的随机试验, 我们并不需要做大量重复的试验就可以得到随机事件的概率. 先看下面的例子.

1. 掷一枚均匀的硬币, 观察硬币落地后哪一面朝上. 这个试验的基本事件空间

$$\Omega = \{\text{正}, \text{反}\}.$$

它只有两个基本事件. 由于硬币的质地是均匀的, 因而直观上可以认为出现“正面向上”与“反面向上”的机会是均等的, 所以掷得“正面向上”和“反面向上”的可能性都是 $\frac{1}{2}$.

2. 掷一颗骰子, 观察出现的点数. 这个试验的基本事件空间

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

它有 6 个基本事件. 由于骰子的构造是均匀的, 因而出现这 6 种结果的机会是均等的, 于是我们可以断言: 掷一颗骰子, 每种结果出现的可能性都是 $\frac{1}{6}$.

3. 一先一后掷两枚硬币, 观察正反面出现的情况, 这个试验的基本事件空间

$$\Omega = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反})\},$$

它有 4 个基本事件. 因为每一枚硬币“出现正面”与“出现反面”机会是均等的, 所以可以认为这 4 个基本事件的出现是等可能的. 因而我们说每一个基本事件发生的可能性都是 $\frac{1}{4}$.

以上 3 个试验有两个共同的特征:

(1) 有限性 在一次试验中, 可能出现的结果只有有限个, 即只有有限个不同的基本事件;

(2) 等可能性 每个基本事件发生的可能性是均等的.

我们称这样的试验为**古典概型**. 上述 3 个例子均为古典概型.

一个试验是否为古典概型, 在于这个试验是否具有古典概型的两个特征——有限性和

等可能性，并不是所有的试验都是古典概型。例如，在适宜的条件下“种下一粒种子观察它是否发芽”，这个试验的基本事件空间为{发芽，不发芽}，而“发芽”或“不发芽”这两种结果出现的机会一般是不均等的。又如，从规格直径为 300 ± 0.6 mm的一批合格产品中任意抽一根，测量其直径 d ，测量值可能是从299.4~300.6 mm之间的任何一个值，所有可能的结果有无限多个。这两个试验都不属于古典概型。

一般地，对于古典概型，如果试验的 n 个基本事件为 A_1, A_2, \dots, A_n ，由于基本事件是两两互斥的，则由互斥事件的概率加法公式得

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(\Omega) = 1.$$

又因为每个基本事件发生的可能性相等，即 $P(A_1) = P(A_2) = \dots = P(A_n)$ ，代入上式得

$$n \cdot P(A_1) = 1, \text{ 即 } P(A_1) = \frac{1}{n}.$$

所以在基本事件总数为 n 的古典概型中，每个基本事件发生的概率为 $\frac{1}{n}$ 。

如果随机事件 A 包含的基本事件数为 m ，同样地，由互斥事件的概率加法公式可得 $P(A) = \frac{m}{n}$ 。所以在古典概型中，

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}}{\text{试验的基本事件总数}}.$$

这一定义称为概率的古典定义。

例 1 掷一颗骰子，观察掷出的点数，求掷得奇数点的概率。

解：这个试验的基本事件空间为

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

基本事件总数 $n=6$ 。事件 $A = \text{“掷得奇数点”} = \{1, 3, 5\}$ ，其包含的基本事件数 $m=3$ ，所以

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5.$$

例 2 从含有两件正品 a_1, a_2 和一件次品 b_1 的3件产品中每次任取1件，每次取出后不放回，连续取两次，求取出的两件产品中恰有一件次品的概率。

解：每次取一个，取后不放回地连续取两次，其一切可能的结果组成的基本事件空间为

$$\Omega = \{(a_1, a_2), (a_1, b_1), (a_2, a_1), (a_2, b_1), (b_1, a_1), (b_1, a_2)\}.$$

其中小括号内左边的字母表示第1次取出的产品，右边的字母表示第2次取出的产品。 Ω 由6个基本事件组成，而且可以认为这些基本事件的出现是等可能的。用 A 表示“取出的两件中，恰好有一件次品”这一事件，则

$$A = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1), (b_1, a_1), (b_1, a_2)\}.$$

事件 A 由4个基本事件组成，因而

$$P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

例 3 在例 2 中, 把“每次取出后不放回”这一条件换成“每次取出后放回”, 其余不变, 求取出的两件中恰好有一件次品的概率.

解: 有放回地连续取出两件, 其一切可能的结果组成的基本事件空间

$$\begin{aligned} \Omega = \{ & (a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_1, b_1), \\ & (a_2, a_1), (a_2, a_2), (a_2, b_1), \\ & (b_1, a_1), (b_1, a_2), (b_1, b_1) \} \end{aligned}$$

由 9 个基本事件组成. 由于每一件产品被取到的机会均等, 因此可以认为这些基本事件的出现是等可能的. 用 B 表示“恰有一件次品”这一事件, 则

$$B = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1), (b_1, a_1), (b_1, a_2)\}.$$

事件 B 由 4 个基本事件组成, 因而

$$P(B) = \frac{4}{9}.$$

例 4 甲、乙两人做出拳游戏 (锤子、剪刀、布). 求:

- (1) 平局的概率;
- (2) 甲赢的概率;
- (3) 乙赢的概率.

解: 甲有 3 种不同的出拳方法, 每一种出法是等可能的, 乙同样有等可能的 3 种不同出法.

一次出拳游戏共有 $3 \times 3 = 9$ 种不同的结果, 可以认为这 9 种结果是等可能的. 所以一次游戏 (试验) 是古典概型. 它的基本事件总数为 9.

平局的含义是两人出法相同, 例如都出了锤. 甲赢的含义是甲出锤且乙出剪, 甲出剪且乙出布, 甲出布且乙出锤这 3 种情况. 乙赢的含义是乙出锤且甲出剪, 乙出剪且甲出布, 乙出布且甲出锤这 3 种情况.

设平局为事件 A , 甲赢为事件 B , 乙赢为事件 C .

由图 3-3 容易得到:

- (1) 平局含 3 个基本事件 (图中的 \triangle);
- (2) 甲赢含 3 个基本事件 (图中的 \odot);
- (3) 乙赢含 3 个基本事件 (图中的 \ast).

由古典概率的计算公式, 可得:

$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3};$$

$$P(B) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3};$$

$$P(C) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$




图 3-3

例 5 抛掷一红、一蓝两颗骰子, 求:

- (1) 点数之和出现 7 点的概率;
- (2) 出现两个 4 点的概率.

解: 用数对 (x, y) 来表示掷出的结果, 其中 x 是红骰子掷出的点数, y 是蓝骰子掷出的点数. 作图 3-4, 从图中容易看出基本事件空间与点集

$$S = \{(x, y) | x \in \mathbf{N}, y \in \mathbf{N}, 1 \leq x \leq 6, 1 \leq y \leq 6\}$$

中的元素一一对应. 因为 S 中点的总数是 $6 \times 6 = 36$ (个), 所以基本事件总数 $n = 36$.

(1) 记“点数之和出现 7 点”的事件为 A , 从图中可看到事件 A 包含的基本事件数共 6 个:

$$(6, 1), (5, 2), (4, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 6),$$

所以

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

(2) 记“出现两个 4 点”的事件为 B , 则从图中可看到事件 B 包含的基本事件数只有 1 个: $(4, 4)$. 所以

$$P(B) = \frac{1}{36}.$$

像例 4、例 5 这样, 在求概率时常常可以把全体基本事件用直角坐标系中的点表示, 以便我们准确地找出某事件所包含的基本事件数.

例 6 每个人的基因都有两份, 一份来自父亲, 另一份来自母亲. 同样地, 他的父亲和母亲的基因也有两份. 在生殖的过程中, 父亲和母亲各自随机地提供一份基因给他们的后代.

以褐色颜色的眼睛为例. 每个人都有一份基因显示他的眼睛颜色:

- (1) 眼睛为褐色;
- (2) 眼睛不为褐色.

如果孩子得到的父母的基因都为“眼睛为褐色”的基因, 则孩子的眼睛也为褐色. 如果孩子得到的父母的基因都为“眼睛不为褐色”的基因, 则孩子眼睛不为褐色(是什么颜色取决于其他的基因). 如果孩子得到的基因中一份为“眼睛为褐色”的, 另一份为“眼睛不为褐色”的, 则孩子的眼睛不会出现两种可能, 而只会出现眼睛颜色为褐色的情况. 生物学家把“眼睛为褐色”的基因叫做显性基因.

方便起见, 我们用字母 B 代表“眼睛为褐色”这个显性基因, 用 b 代表“眼睛不为褐色”这个基因. 每个人都有两份基因, 控制一个人眼睛颜色的基因有 BB, Bb (表示父亲提供基因 B , 母亲提供基因 b), bB, bb . 注意在 BB, Bb, bB 和 bb 这 4 种基因中只有 bb 基因显示为眼睛颜色不为褐色, 其他的基因都显示眼睛颜色为褐色.

假设父亲和母亲控制眼睛颜色的基因都为 Bb , 则孩子眼睛不为褐色的概率有多大?




图 3-4

解：由于父亲和母亲控制眼睛颜色的基因都为 Bb，从而孩子有可能产生的基因有 4 种，即 BB, Bb, bB, bb (图3-5). 又因为父亲或母亲提供给孩子基因 B 或 b 的概率是一样的，所以可以认为孩子的基因是这 4 种中的任何一种的可能性是一样的. 因此，这是一个古典概型问题. 只有当孩子的基因为 bb 时，眼睛才不为褐色，所以，“孩子眼睛不为褐色”这个随机事件发生的概率为 $\frac{1}{4}=0.25$ (有兴趣的同学可以自己推导一下其他情况).




图 3-5

3.2.2

概率的一般加法公式(选学)

在概率的加法公式中，如果 A, B 不是互斥事件，那么公式是否成立呢？我们看下面的例子.

例 1 掷红、蓝两颗骰子. 事件 $A = \{\text{红骰子点数大于 } 3\}$ ，事件 $B = \{\text{蓝骰子的点数大于 } 3\}$. 求事件 $A \cup B = \{\text{至少有一颗骰子点数大于 } 3\}$ 发生的概率.

显然，事件 A 与 B 不是互斥的. 例如，蓝骰子出现 4 点时，红骰子也可能出现 4 点. 我们把由事件 A 和 B 同时发生所构成的事件 D，称为事件 A 与 B 的**交** (或**积**)，记作 $D = A \cap B$ (或 $D = AB$).




图 3-6

事件 $A \cap B$ 是由事件 A 和 B 所共同含有的基本事件组成的集合. 如图 3-6 中阴影部分就是表示 $A \cap B$.

本例中， $A \cap B$ 为

$$\{(4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\},$$

其中小括号内的左、右两个数分别表示红、蓝两颗骰子出现的点数.

解：做点集

$\Omega = \{(x, y) | x \in \mathbf{N}, y \in \mathbf{N}, 1 \leq x \leq 6, 1 \leq y \leq 6\}$ (如图3-7).

在点的坐标 (x, y) 中， x 表示红骰子出现的点数， y 表示蓝骰子出现的点数，则 Ω 就表示试验可能出现的结果的全体构成的集合. 因为

$$\Omega \text{ 中元素的总个数} = 6 \times 6 = 36,$$

$$A \text{ 中元素的个数} = 18,$$

$$B \text{ 中元素的个数} = 18,$$

$$A \cup B \text{ 中元素的个数} = 27,$$




图 3-7

$$\text{所以 } P(A \cup B) = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}.$$

在本例中, 因为 $A \cap B \neq \emptyset$, 所以 $P(A \cup B) \neq P(A) + P(B)$.
我们在古典概型的情况下推导概率的一般加法公式.

设 A, B 是 Ω 的两个事件 (图 3-8). 容易看出, $A \cup B$ 中基本事件的个数等于 A 中基本事件的个数加上 B 中基本事件的个数减去 $A \cap B$ 中基本事件的个数. 所以




图 3-8

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= \frac{A \cup B \text{ 中包含的基本事件数}}{\Omega \text{ 的基本事件总数}} \\ &= \frac{A \text{ 中基本事件的个数} + B \text{ 中基本事件的个数} - A \cap B \text{ 中基本事件的个数}}{\Omega \text{ 的基本事件总数}} \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B), \end{aligned}$$

即 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$,
这就是概率的一般加法公式.

例 2 一个电路板上装有甲、乙两根熔丝, 甲熔断的概率为 0.85, 乙熔断的概率为 0.74, 两根同时熔断的概率为 0.63, 问至少有一根熔断的概率是多少?

解: 设 $A =$ “甲熔丝熔断”, $B =$ “乙熔丝熔断”, 则 “甲、乙两根熔丝中至少有一根熔断” 为事件 $A \cup B$. 所以

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0.85 + 0.74 - 0.63 \\ &= 0.96. \end{aligned}$$

习题 3-2

A

1. 从含有三件正品和一件次品的 4 件产品中不放回地任取两件, 求取出的两件中恰有一件次品的概率.
2. 从 1, 2, 3, 4, 5 这 5 个数字中, 不放回地任取两数, 求两数都是奇数的概率.
3. 在一次问题抢答的游戏中, 要求答题者在问题所列出的 4 个答案中找出唯一正确的答案. 某抢答者不知道正确答案便随意说出了其中的一个答案, 求这个答案恰好是正确答案的概率.
4. 同时抛掷 2 分和 5 分的两枚硬币, 计算:
 - (1) 两枚都出现正面的概率;
 - (2) 一枚出现正面, 一枚出现反面的概率.
5. 把一个体积为 64 cm^3 的正方体木块表面涂上红漆, 然后锯成体积为 1 cm^3 的小正方体, 从中任取一块, 求这块只有一面涂红漆的概率.
- 6.* 从 1, 2, 3, \dots , 30 中任意选一个数, 求下列事件的概率:
 - (1) 它是偶数;
 - (2) 它不能被 3 整除;

(3) 它是偶数且能被 3 整除的数;

(4) 它是偶数或能被 3 整除的数.

7.* 掷红、蓝两颗骰子, 观察出现的点数. 求至少一颗骰子出现偶数点的概率.

习题 3-2 B

1. 抛掷两颗骰子, 计算:

(1) 事件“两颗骰子点数相同”的概率;

(2) 事件“点数之和小于 7”的概率;

(3) 事件“点数之和等于或大于 11”的概率;

(4) 在点数和里最容易出现的数是几?

2. 一只口袋装有形状大小都相同的 6 只小球, 其中有 2 只白球, 2 只红球和 2 只黄球, 从中随机摸出 2 只球. 试求:

(1) 2 只球都是黄球的概率;

(2) 2 只球颜色不同的概率.

3. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标, 求点 P 落在圆 $x^2 + y^2 = 16$ 内的概率.

3.3 随机数的含义与应用

3.3.1 几何概型

在古典概型中利用等可能性的概念，成功地计算了某一类问题的概率。不过，古典概型要求可能结果的总数必须有限。人们希望能把这种做法推广到无限多结果而又有某种等可能性的场合，得到随机事件的概率。

例 1 如图 3-9，转盘上有 8 个面积相等的扇形。转动转盘，求转盘停止转动时指针落在阴影部分的概率。

例 2 在 500 mL 的水中有一只草履虫，现从中随机取出 2 mL 水样放到显微镜下观察，求发现草履虫的概率。

以上 2 个试验的可能结果个数无限，所以它们都不是古典概型。

我们先来分析例 1，根据日常生活经验，不难理解事件 A：“指针落在阴影部分”的概率可以用阴影部分面积与总面积之比来衡量，

$$\text{即 } P(A) = \frac{4}{8} = 0.5.$$

同样地，例 2 中由于取水样的随机性，所求事件 A：“在取出的 2 mL 水样中有草履虫”的概率等于水样的体积与总体积之比 $\frac{2}{500} = 0.004$ 。

总之，这两个试验的共同点是：

事件 A 理解为区域 Ω 的某一子区域 A (图 3-10)，A 的概率只与子区域 A 的几何度量（长度、面积或体积）成正比，而与 A 的位置和形状无关。满足以上条件的试验称为**几何概型**。在几何概型中，事件 A 的概率定义为：

$$P(A) = \frac{\mu_A}{\mu_\Omega},$$

其中 μ_Ω 表示区域 Ω 的几何度量， μ_A 表示子区域 A 的几何度量。

例 3 一海豚在水池中自由游弋。水池为长 30 m，宽 20 m 的长方形。求此刻海豚嘴




图 3-9




图 3-10

尖离岸边不超过2 m的概率.

解: 对于几何概型,关键是要构造出随机事件对应的几何图形,利用图形的几何度量来求随机事件的概率.如图3-11所示,区域 Ω 是长30 m,宽20 m的长方形.图中阴影部分表示事件A:“海豚鼻尖离岸边不超过2 m”.问题可以理解为求海豚鼻尖出现在图3-11中阴影部分的概率,于是 $\mu_{\Omega}=30 \times 20=600(\text{m}^2)$, $\mu_A=30 \times 20-26 \times 16=184(\text{m}^2)$.




图 3-11

$$P(A) = \frac{\mu_A}{\mu_{\Omega}} = \frac{184}{600} = \frac{23}{75}$$

例 4 平面上画了一些彼此相距 $2a$ 的平行线,把一枚半径 $r < a$ 的硬币任意掷在这平面上,求硬币不与任一条平行线相碰的概率.

解: 设事件A:“硬币不与任一条平行线相碰”.为了确定硬币的位置,由硬币中心 O 向靠得最近的平行线引垂线 OM ,垂足为 M ,参看图3-12.这样线段 OM 长度(记作 $|OM|$)的取值范围是 $[0, a]$,其长度就是几何概型定义中区域 Ω 的几何度量.只有当 $r < |OM| \leq a$ 时硬币不与平行线相碰,其长度就是子区域 A 的几何度量.所以,




图 3-12

$$P(A) = \frac{[r, a] \text{ 的长度}}{[0, a] \text{ 的长度}} = \frac{a-r}{a}$$

3.3.2

随机数的含义与应用

随机数就是在一定范围内随机产生的数,并且得到这个范围内的每一个数的机会一样.它有很广阔的应用,可以帮助我们安排和模拟一些试验,这样可以代替我们自己做大量重复的试验.

很自然的一个问题是如何产生随机数呢?下面我们介绍一下如何使用计算器和计算机产生随机数.

现在大部分计算器都能产生 $0 \sim 1$ 之间的均匀随机数(实数),例如,用函数型计算器产生随机数的方法如下:

每次按 **[SHIFT] [Ran#]** 键都会产生一个 $0 \sim 1$ 之间的随机数,而且出现 $0 \sim 1$ 内任何一个数的可能性是相同的.

也可以使用计算机软件来产生随机数,这里介绍 Scilab 中产生随机数的方法.

Scilab 中用 `rand()` 函数来产生 $0 \sim 1$ 的均匀随机数.每调用一次 `rand()` 函数,就产生一个随机数.

如果要产生 $a \sim b$ 之间的随机数,可以使用变换 `rand() * (b-a) + a` 得到,请同学们

想一想其中的道理.

在 2.1.1 节中, 我们已经介绍过利用随机数表从 850 颗种子中抽取 50 颗种子做试验的例子. 这里再举一个利用随机模拟掷硬币的试验.

例 1 随机模拟掷硬币的试验, 估计掷得正面的概率.

解: 用计算器产生随机数的方法模拟掷硬币试验.

首先用计算器产生一个 $0 \sim 1$ 之间的随机数, 如果这个随机数在 $0 \sim 0.5$ 之间, 则认为硬币正面朝上; 如果这个随机数在 $0.5 \sim 1$ 之间, 则认为硬币正面朝下. 记下正面朝上的频数及试验总次数, 就可以得到正面朝上的频率了.

计算器模拟掷硬币的试验结果:

试验次数	正面朝上频数	正面朝上频率
5	2	0.4
10	3	0.3
15	6	0.4
20	9	0.45
25	12	0.48
30	12	0.4
35	16	0.457
40	20	0.5
45	21	0.467
50	23	0.46
55	27	0.491
60	29	0.483
65	31	0.477
70	32	0.457
75	35	0.467
80	38	0.475
85	43	0.506
90	47	0.522
95	50	0.526
100	54	0.54

从这个结果我们也可以看出硬币出现正面的频率在 0.5 附近. 因此, 我们可以认为硬币出现正面的概率为 0.5. 我们还可以用刚才提到的用计算机产生随机数的方法来模拟这个试验. 试验的方法是类似的. 有兴趣的同学可以自己动手做一下.



探索与研究

现在很多城市的中考或高考都采取产生随机数的方法把考生分配到各个考场中. 有条件的学生, 可以实际调查一下本城市的中考或高考用什么办法产生随机数, 又是如何应用随机数把考生分配到各考场去的.

例 2 随机模拟 3.3.1 节中例 3 海豚在水池中自由游弋的试验, 并且估计事件 A: “海豚鼻尖离岸边不超过 2 m” 的概率.

我们利用计算机产生随机数 x 和 y , 用它们来表示海豚嘴尖的横坐标与纵坐标. 如果 (x, y) 出现在图 3-11 的阴影部分中, 我们就认为事件 A 发生了.

下面我们设计一个算法使得计算机或计算器能模拟这个试验, 并且估计事件 A 发生的概率.

S1 用计数器 n 记录做了多少次试验, 用计数器 m 记录其中有多少次 (x, y) 出现在阴影部分中. 首先置 $n=0, m=0$.

S2 用变换 $\text{rand}() * 30 - 15$ 产生 $-15 \sim 15$ 之间的随机数 x 作为海豚嘴尖的横坐标; 用变换 $\text{rand}() * 20 - 10$ 产生 $-10 \sim 10$ 之间的随机数 y 作为海豚嘴尖的纵坐标.

S3 判断 (x, y) 是否落在阴影部分中, 即是否满足 $||x| - 15| \leq 2$ 或 $||y| - 10| \leq 2$. 如果是, 则计数器 m 的值加 1, 即 $m=m+1$. 如果不是, m 的值保持不变.

S4 表示随机试验次数的计数器 n 值加 1, 即 $n=n+1$. 如果还需要继续试验, 则返回步骤 S2 继续执行, 否则, 程序结束.

程序结束后事件 A 发生的频率 $\frac{m}{n}$ 作为 A 的概率的近似值.

本书用 Scilab 编制了一个模拟程序, 模拟的结果如下, 供大家参考.

试验次数 n	事件 A 频数 m	事件 A 频率 m/n
100	35	0.35
1 000	324	0.324
10 000	2 997	0.299 7
100 000	30 506	0.305 06

同学们用这个表中的数据与 3.3.1 节中例 3 算出的事件 A 的概率比较, 你发现了什么?

例 3 利用随机数和几何概型求 π 的近似值.

在图 3-13 所示的边长为 2 的正方形中随机撒一大把豆子, 计算落在正方形的内切圆中的豆子数与落在正方形中的豆子数之比, 并以此估计圆周率 π 的值.

如果我们将“在正方形中撒豆子”看成试验, 把“豆子落在




图 3-13

圆中”看成随机事件 A ，则落在圆中的豆子数与落在正方形中的豆子数的比值就是事件 A 发生的频率。当我们撒一大把豆子时，这时频率可以近似地看成事件 A 的概率，可以认为这是一个几何概型问题。由几何概型的计算公式，我们可以计算出

$$P(A) = \frac{\text{圆面积}}{\text{正方形面积}} \\ = \frac{\pi}{4}.$$

所以， $\pi = 4 \times P(A)$ 。

我们在正方形中撒了 n 颗豆子，其中有 m 颗豆子落在圆中，则圆周率的值 π 近似等于 $\frac{4m}{n}$ 。

类似例 2 的方法，我们现在来设计一个算法使得用计算机或计算器能模拟这个撒豆子试验。

S1 用计数器 n 记录做了多少次撒豆子试验，用计数器 m 记录其中有多少颗豆子落入圆中。首先置 $n=0$ ， $m=0$ 。

S2 用变换 $\text{rand}() * 2 - 1$ 产生两个 $-1 \sim 1$ 之间的随机数 x 和 y ，用它们来表示豆子的横坐标与纵坐标。

S3 判断豆子 (x, y) 是否落在圆中，即是否满足 $x^2 + y^2 \leq 1$ 。如果是，则计数器 m 的值加 1，即 $m = m + 1$ 。如果不是， m 的值保持不变。

S4 表示试验次数的计数器 n 值加 1，即 $n = n + 1$ 。如果还需要继续试验，则返回步骤 S2 继续执行，否则，程序结束。

程序结束后算出 $\frac{4m}{n}$ 作为 π 的近似值。

本书用 Scilab 编制了一个模拟程序，模拟的结果如下，供大家参考。

注

可结合 Scilab 样例演示菜单中的撒豆子程序，自己动手通过随机模拟的方法估计圆周率 π 。

试验次数 n	豆子落在圆内次数 m	π 的近似值 $4m/n$
100	77	3.08
1 000	773	3.092
10 000	7 905	3.162
100 000	78 426	3.137 04
1 000 000	785 200	3.140 8

通过试验，我们可以看出随着试验次数的增加，得到的圆周率 π 的近似值精度越来越高。

例 2 和例 3 采用的基本方法是：建立一个概率模型，它与某些我们感兴趣的量（如例 2 的概率值、例 3 的常数 π ）有关，然后设计适当的试验，并通过这个试验的结果来确定这些量。按照以上思路建立起来的方法称为**计算机随机模拟法**或**蒙特卡罗 (Monte Carlo) 方法**。现在，随着计算机科学与技术的飞速发展，用计算机来模拟所设计的试验已经变得

习题 3-3 B

1. 某人在家门前相距 6 m 的两棵树间系一条绳子，并在绳子上挂一个衣架，求衣架钩与两树的距离都大于 2 m 的概率.
2. 设 A 为圆周上一定点，在圆周上等可能地任取一点与 A 连接，求弦长超过半径的概率.
3. 有兴趣的同学可尝试用计算器或计算机模拟掷骰子的试验，并且计算出现 1 点的频率.

3.4 概率的应用

概率在我们的现实生活中有很多应用。比如说，利用投硬币出现正面和反面的概率一样来决定足球比赛两队谁先开球或谁先选场地，用摇号的方法决定中奖号码，等等。实际上，概率的应用已经涉及很多领域，本节将介绍下面4个例子。

例 1 在英语中某些字母出现的概率远远高于另外一些字母。在进行了更深入的研究之后，人们还发现各个字母被使用的频率相当稳定。例如，下面就是英文字母使用频率的一份统计表。

字母	空格	E	T	O	A	N	I	R	S
频率	0.2	0.105	0.071	0.064 4	0.063	0.059	0.054	0.053	0.052
字母	H	D	L	C	F	U	M	P	Y
频率	0.047	0.035	0.029	0.023	0.022 1	0.022 5	0.021	0.017 5	0.012
字母	W	G	B	V	K	X	J	Q	Z
频率	0.012	0.011	0.010 5	0.008	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001

从表中我们可以看出，空格的使用频率最高。有鉴于此，人们在设计键盘时，空格键不仅最大，而且放在使用方便的位置。

近年来对汉语的统计研究有了很大的发展。关于汉字的使用频率已有初步统计资料，对汉语常用词也作了一些统计研究。这些信息对汉字输入方案等的研制有很大帮助。使用过汉字拼音输入法的同学可能有体会。如图 3-15，当输入拼音“shu”，则提示有以下几种可供选择“1. 数，2. 书，3. 树，4. 属，5. 署……”。这个显示顺序基本上就是按照拼音为“shu”的汉字出现频率从大到小排列的。




图 3-15

例 2 在密码的编制和破译中, 概率论起着重要的作用. 要使敌人不能破译电文而又能使盟友容易译出电文, 一直是外交官和将军们关心的问题. 为了保密, 通信双方事先有一个秘密约定, 称为密钥. 发送信息方要把发出的真实信息——明文, 按密钥规定, 变成密文. 接收方将密文按密钥还原成明文. 例如, 古罗马伟大的军事和政治家凯撒大帝把明文中的每个字母按拉丁字母次序后移三位之后的字母来代替, 形成密文. 接收方收到密文后, 将每个字母前移三位后便得到明文. 这是一种原始的编制密码方法, 很容易破译.

在书面语言中单个的字母不是以同样的频率出现的. 从例 1 中英文字母出现频率的统计表中我们可以看出, 在英文常用文章中, 平均说来出现字母“E”的频率约为 10.5%, “T”约为 7.1%, 而“J”的出现频率远小于 1%. 例如像凯撒大帝用过的简单密码, 用 FRGHV 来代替 CODES, 容易通过对电文中字母的频率分析来破译. 出现频率最高的字母大概表示“E”, 出现频率次高的字母大概是“T”, 等等.

现代保密系统采用了能确保每个字母出现在密文中的概率都相等的技术. 一种理论上不可破译的密码是“一次性密码本”(用后立即销毁). 这种密码本是一长串的随机数, 每个都在 1 和 26 之间. 这样一种密码本可能从以下数开始: 19, 7, 12, 1, 3, 8, … . 如“ELEVEN”这个词, 用按字母表顺序排在 E 后面第 19 个字母表示 E, 而用 L 后面第 7 个字母表示 L, 等等. 因此, ELEVEN 变成了 XSQWHV. 注意, 尽管在明文中“E”出现 3 次, 但是在密文 XSQWHV 中却是用三个不同的字母来替换的.

例 3 社会调查人员希望从人群的随机抽样调查中得到对他们所提问题诚实的回答. 但是被采访者常常不愿意如实地作出应答.

1965 年 Stanley L. Warner 发明了一种应用概率知识来消除这种不愿意情绪的方法. Warner 的随机化应答方法要求人们随机地回答所提两个问题中的一个, 而不必告诉采访者回答的是哪个问题. 两个问题中有一个是敏感的或者是令人难为的; 另一个问题是无关紧要的. 这样应答者将乐意如实地回答问题, 因为只有他知道自己回答的是哪个问题.

例如在调查运动员服用兴奋剂的时候, 无关紧要的问题是: “你的身份证号码的尾数是奇数吗?” 敏感的问题是: “你服用过兴奋剂吗?” 然后要求被调查的运动员掷一枚硬币. 如果出现正面, 就回答第一个问题, 否则回答第二个问题.

假如我们把这种方法用于 200 个被调查的运动员, 得到 54 个“是”的回答. 因为掷硬币出现正面的概率为 $\frac{1}{2}$, 我们期望大约有 100 人回答了第一个问题. 因为身份证号码尾数是奇数或偶数的可能性是同样的, 因而在回答第一个问题的 100 人中大约有一半人, 即 50 人, 回答了“是”. 其余 4 个回答“是”的人服用过兴奋剂. 由此我们估计这群人中大约有 4% 的人服用过兴奋剂.

例 4 为了估计水库中的鱼的尾数, 可以使用以下的方法: 先从水库中捕出一定数量的鱼, 例如 2 000 尾, 给每尾鱼作上记号, 不影响其存活, 然后放回水库. 经过适当的时间, 让其和水库中其余的鱼充分混合, 再从水库中捕出一定数量的鱼, 例如 500 尾, 查看其中有记号的鱼, 设有 40 尾. 试根据上述数据, 估计水库内鱼的尾数.

设水库中鱼的尾数为 n , n 是未知的, 现在要估计 n 的值, 将 n 的估计值记作 \hat{n} (读作

“ n 估”或“ n 尖”).

假定每尾鱼被捕的可能性是相等的, 从库中任捕一尾, 设事件

$$A = \{\text{带有记号的鱼}\},$$

则由古典概型可知

$$P(A) = \frac{2\,000}{n}. \quad \textcircled{1}$$

第二次从水库中捕出 500 尾, 观察每尾鱼上是否有记号, 共需观察 500 次, 其中带有记号的鱼有 40 尾, 即事件 A 发生的频数 $m = 40$, 由概率的统计定义可知

$$P(A) \approx \frac{40}{500}. \quad \textcircled{2}$$

由①②两式, 得

$$\frac{2\,000}{n} \approx \frac{40}{500}.$$

解得 $n \approx 25\,000$, 即 $\hat{n} = 25\,000$.

所以, 估计水库中约有鱼 25 000 尾.

习题 3-4

- 某水产试验厂实行某种鱼的人工孵化, 10 000 个鱼卵能孵出 8 513 尾鱼苗, 根据概率的统计定义解答下列问题:
 - 求这种鱼卵的孵化概率 (孵化率).
 - 30 000 个鱼卵大约能孵化多少尾鱼苗?
 - 要孵化 5 000 尾鱼苗, 大概得备多少鱼卵? (精确到百位)
- 举出一些现实生活中应用概率的例子.

本章小结

I 知识结构



II 思考与交流

1. 随机事件的发生具有不确定性. 想一想, 你的周围哪些事情的发生具有不确定性.
2. 掷一颗骰子得到 6 点的概率是 $\frac{1}{6}$, 是否意味着把它掷 6 次能得到一次 6 点? 用概率的统计定义来说明你的观点.
3. 把一枚图钉扔在地上, 它可能针尖朝上, 也可能针尖朝下, 这是不是古典概型? 古典概型有哪些特征?
4. 有人说, 求单位正方形里任何小块的面积近似值都可以用撒豆子的方法来解决. 这种说法对不对? 理由是什么? 具体应该怎样做?
5. 找一个实际生活中应用随机数的例子, 如找不到, 就编一道应用随机数的习题.

III 巩固与提高

1. 判断下列命题的真假:
 - (1) 必然事件的概率等于 1;
 - (2) 某事件的概率等于 1.1;
 - (3) 互斥事件一定是对立事件;

(4) 对立事件一定是互斥事件；

(5) 在适宜的条件下种下一粒种子，观察它是否发芽，这个试验为古典概型。

2. 填空：

(1) 掷一颗骰子，出现3点或5点的概率等于_____；

(2) 掷两颗骰子，出现点数之和等于8的概率等于_____；

(3) 掷三枚硬币，至少出现一个正面的概率等于_____；

(4) 抛掷一颗骰子， $A = \{\text{点数是奇数点}\}$ ， $B = \{\text{点数是偶数点}\}$ ，则 $A \cup B =$ _____， $A \cap B =$ _____， $\bar{B} =$ _____， $\bar{A} \cap B =$ _____；

(5) 已知 $P(A) = \frac{2}{5}$ ，则 $P(\bar{A}) =$ _____；

(6) 从至少含有5件次品的10件产品中，任取3件，事件“所取3件都是正品”的对立事件为_____，事件“所取3件至多有一件是正品”的对立事件为_____。

3. 某台电话，打进的电话响第1声时，被接的概率是0.2，响第2声时，被接的概率是0.3，响第3声时，被接的概率是0.3，响第4声时，被接的概率是0.1，那么电话在响前4声内被接的概率是多少？

IV 自测与评估

1. 有五条线段，长度分别为1, 3, 5, 7, 9. 从这五条线段中任取三条，求所取三条线段能构成一个三角形的概率。

2. 在面积为S的 $\triangle ABC$ 的边AB上任取一点P，求 $\triangle PBC$ 的面积大于 $\frac{S}{3}$ 的概率。

3. 把一颗骰子投掷2次，观察出现的点数，并记第一次出现的点数为a，第二次出现的点

数为b. 试就方程组 $\begin{cases} ax+by=3 \\ x+2y=2 \end{cases}$ 解答下列各题：

(1) 求方程组只有一个解的概率；

(2) 求方程组只有正数解的概率。



概率论的起源

1494年,意大利的帕奇欧里在一本有关计算技术的教科书中,提出了一个问题是,一场赌赛,胜六局才算赢,当两个赌徒一个胜五局,另一个胜两局时,中止赌赛,赌金该怎样分配才合理?帕奇欧里给出的答案是按5:2分.后来人们一直对这种分配原则表示怀疑,但没有一个人提得出更合适的办法来.

时间过去了半个世纪,另一名意大利数学家卡当(1501—1576),潜心研究赌博不输的方法,出版了一本《赌博之书》.在书里提出了这样一个问题:掷两颗骰子,以两颗骰子的点数和作赌赛,那么押几点最有利?卡当认为7最好.卡当还对帕奇欧里提出的问题进行过研究,提出过疑义,指出需要分析的不是已经赌过的次数,而是剩下的次数.卡当对问题的解决,虽然有了正确的思路,但没有得到正确的答案.

时间又过了一个世纪,1651年法国著名数学家帕斯卡(1623—1662)收到了法国大贵族德·美黑的一封信,在信中向帕斯卡请教分赌金的问题:“两个赌徒规定谁先赢 s 局就算赢了.如果一个人赢 a ($a < s$)局,另一人赢 b ($b < s$)局时,赌博中止,应该怎样分配赌本才算公平合理?”

这个问题把帕斯卡给难住了.帕斯卡苦思冥想3年才悟出了满意的解法.于1654

年7月29日把这个问题连同解答寄给了法国数学家费马(1601—1665).不久,费马在回信中给出另一解法,他们两人频繁通信,深入探讨这类问题.这个信息,后来被荷兰数学家惠更斯获悉,惠更斯对这类问题备感兴趣,很快地加入了对这类问题的探讨,并把对这类问题的探讨的结果载入1657年出版的《论骰子游戏中的推理》一书中.这本书引入了数学期望的概念,是概率论的第一部著作.这样,数学的一个新分支——概率论诞生了.至此,延续了一个半世纪分赌金的疑难问题,在概率论的诞生与发展中得到解决.

赌博历来是各民族不齿的行为,但它又是很典型的随机试验,其数学模型干净利落,极具代表性.数学家们从中获取数学思想与方法,用以解决其他实际问题.

18~19世纪,随着社会的进步,人口理论、保险业、误差理论等方面的发展,不仅使概率论得到了实际应用,而且刺激了概率论的发展.20世纪初,俄罗斯数学家科尔莫戈罗夫建立了严谨的概率论理论体系.由此,概率论不仅成为一门重要的数学学科,而且已渗透到自然科学、社会科学、人文科学等各个领域,发挥着越来越重要的作用.

附录

部分中英文词汇对照表

算法	algorithm
框图	flow chart
输入语句	input statement
输出语句	output statement
赋值语句	assignment statement
条件语句	conditional statement
循环语句	loop statement
抽样方法	sampling method
简单随机抽样	simple random sampling
系统抽样	systematic sampling
分层抽样	stratified sampling
总体	population
样本	sample
必然事件	certain event
不可能事件	impossible event
试验	trial
随机事件	random event
频率	frequency
等可能事件	equiprobability event
基本事件	elementary event
概率	probability
互斥事件	exclusive events
对立事件	complementary events
平均数	mean
中位数	median
方差	variance
标准差	standard deviation
相关	correlation
散点图	scatter diagram
直方图	histogram
回归直线	regression straight line
相关系数	correlation coefficient

后记

根据教育部制订的普通高中各学科课程标准(实验),人民教育出版社课程教材研究所编写的各学科普通高中课程标准实验教科书,得到了诸多教育界前辈和各学科专家学者的热情帮助和大力支持。在各学科教科书终于同课程改革实验区的师生见面时,我们特别感谢担任教科书总顾问的丁石孙、许嘉璐、叶至善、顾明远、吕型伟、王梓坤、梁衡、金冲及、白春礼、陶西平同志,感谢担任教科书编写指导委员会主任委员的柳斌同志和编写指导委员会委员的江蓝生、李吉林、杨焕明、顾泠沅、袁行霁等同志。

本套高中数学实验教科书(B版)的总指导为丁尔陞教授。从教材立项、编写、送审到进入实验区实验的过程中,在丁尔陞、孙瑞清、江守礼、房良孙、王殿军等专家教授的指导下,经过实验研究组全体成员的努力,基本上完成了“课标”中各模块的编写任务,并通过了教育部的审查。

山东、辽宁等实验区的教研员和教师在实验过程中,对教材编写的指导思想、教材内容的科学性、基础性、选择性以及是否易教、易学等诸方面,进行了审视和检验,提出了许多的宝贵意见,并针对教材和教学写出了大量的论文。我们在总结实验的基础上,逐年对教材进行认真的修改,使教材不断地完善。现在所取得的成果,是实验研究组全体成员、编者,实验区的省、市、县各级教学研究员及广大数学教师集体智慧的结晶。

各实验区参加教材审读、研讨及修改的主要成员有:

韩际清、常传洪、尹玉柱、秦玉波、祝广文、尚凡青、杨长智、田明泉、邵丽云、于世章、李明照、胡廷国、张颖、张成钢、李学生、朱强、窦同明、姜传祯、韩淑勤、王宗武、黄武昌。

刘莉、宋明新、高锦、赵文莲、王孝宇、周善富、胡文亮、孙家逊、舒凤杰、齐力、林文波、教丽、刘鑫、李凤、金盈、潘戈、高钧、魏明智、刘波、崔贺、李忠、关玲、郝军、郭艳霞、董晖、赵光千、王晓声、王文、姚琳。

在此,特向参与、帮助、支持这套教科书编写的专家、学者和教师深表谢意。

我们还要感谢实验区的教育行政和教研部门,以及使用本套教材的师生们。

让我们与一切关心这套教材建设的朋友们,共同携起手来,为建设一套具有中国特色的高中数学教材而努力。

我们的联系方式如下:

电话:010-58758523 010-58758532

电子邮件:longzw@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
中学数学教材实验研究组

